

Aflofarm, Krople żołądkowe, 35g



Cena: 4,60 PLN

Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Producent / Marka | Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. |
| Substancja czynna | Productum compositum |
| Typ produktu | Lek ziołowy |

Opis produktu

Lek bez recepty

Krople żołądkowe, Aflofarm, 35g

Skład:

Substancje czynne :

- Valerianae tinctura DER 1:4,0-4,5 ekstrahent – etanol 70% (V/V) 25 g
- Menthae piperitae tinctura cum Menthae piperitae aetheroleo

DER 1:18-20 ekstrahent – etanol 90% (V/V) 25 g

- Hyperici intractum DER 1:1 ekstrahent – etanol 96% (V/V) 25 g
- Amara tinctura (DER 1:3,8-4,5) ekstrahent – etanol 70% (V/V) 25 g

Zawartość etanolu: 65-72% (V/V).

Substancje pomocnicze: Brak

100 g preparatu zawiera: 25 g nalewki z korzenia kozłka lekarskiego, 25 g nalewki z liścia mięty pieprzowej, 25 g wyciągu z dziurawca, 25 g nalewki gorzkiej. Preparat zawiera 65-72% etanolu (v/v).

Wskazania:

- Krople stosowane są tradycyjnie w zaburzeniach trawienia, braku łaknienia, niestrawności

Działanie:

- **Krople żołądkowe** pobudzają łaknienie i wydzielanie soku żołądkowego. Działanie pobudzające łaknienie i wydzielanie soku żołądkowego związane jest z obecnością substancji goryczkowych i olejków eterycznych.
- Działanie pobudzające łaknienie i wydzielanie soku żołądkowego związane jest z obecnością substancji goryczkowych i olejków eterycznych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- 15 kropli w kieliszku wody, stosować od 3 do 6 razy na dobę, 30 minut przed jedzeniem.

Jeżeli dolegliwości utrzymują się lub nasilają podczas stosowania produktu leczniczego, należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób podawania:

- Podanie doustne.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników.

- Choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

- Sporadyczne przypadki nietolerancji korzenia waleriany (dolegliwości żołądkowo-jelitowe, np. nudności, skurcze brzucha).
- U osób wrażliwych może wystąpić zgaga.
- Ze względu na zawartość inkraktu z dziurawca może wystąpić nadwrażliwość na światło słoneczne, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji.

- W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych, niewymienionych powyżej, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

- Ten produkt leczniczy zawiera 356 mg alkoholu (etanolu) w każdym 15 kroplach (0,6 mL), co jest równoważne 59,33% (w/v).
- Ilość alkoholu w 15 kroplach (0,6 mL) tego produktu leczniczego jest równoważna mniej niż 9 mL piwa lub 4 mL wina.
- Mała ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym nie będzie powodowała zauważalnych skutków.

Ciąża i karmienie piersią:

- Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu, nie zaleca się stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Produkt leczniczy może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Interakcje z innymi lekami:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

- Nie są znane.

Przechowywanie:

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Afłofarm Farmacja Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.