

# Allegra, lek przeciwalergiczny, katar, łzawienie oczu 120mg x 10 tabletek



Cena: 17,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Opella healthcare
Substancja czynna	Fexofenadinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Allegra 120 mg, lek przeciwalergiczny - 10 tabletek powlekanych

## (Fexofenadini hydrochloridum)

## Opis produktu:

Allegra to produkt leczniczy do stosowania w katarze siennym (z towarzyszącym kichaniem, swędzeniem, katarzem) z objawami zaczerwienienia i łzawienia oczu.

## Skład:

- Substancja czynna - feksofenadyna (chlorowodorek feksofenadyny)
- Substancje pomocnicze - skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna, makrogl 400, tlenek żelazaczerny (E 172) oraz tlenek żelaza żółty (E 172)

1 tabletkę zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodoru (Fexofenadini hydrochloridum)

## Wskazania:

U dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych w leczeniu objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak:

- kichanie
- swędzenie nosa
- katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie
- zaczerwienienie i łzawienie oczu

## Działanie:

- **Feksofenadyna** jest lekiem przeciwhistaminowym, blokującym receptory H1, nie wywierającym działania sedatywnego
- jej działanie rozpoczyna się w ciągu godziny od podania
- Allegra działa przez 24 godziny

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- dla osób dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i starszych **1 tabletkę dziennie**
- tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem, popijając wodą
- jeśli objawy nie ustąpią po 5 dniach od rozpoczęcia stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

- uczulenie na którykolwiek ze składników leku, lub jeśli pacjent ma uczulenie na feksofenadyny chlorowodorek
- nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

**Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów):**

- bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy

**Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):**

- zmęczenie/senność

**Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to:**

- trudności w zasypianiu (bezsenna), zaburzenia snu, koszmary senne/wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej, nagłe zaczerwienienie skóry

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Allegra jeśli:

- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby
- u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować przyspieszoną lub nieregularną czynność serca
- pacjent jest w podeszłym wieku
- pacjent ma wątpliwości, przed zastosowaniem leku Allegra powinien poradzić się lekarza lub farmaceuty

**Ciąża, karmienie piersią:**

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- leku Allegra nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne
- nie zaleca się stosowania leku Allegra w okresie karmienia piersią

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

- jest mało prawdopodobne, aby Allegra wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów głowy.
- jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

**Allegra może wchodzić w interakcje z:**

- lekami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez (zmniejszenie wchłaniania leku) - należy zachować 2-godzinny odstęp pomiędzy lekami

**Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.

- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C

## Podmiot odpowiedzialny:

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.**