

Allertec WZF 10 mg 10 tabletek



Cena: 8,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Cetirizinum
Typ produktu	

Opis produktu

Produkt leczniczy bez recepty

Allertec WZF, 10 mg - 10 tabletek powlekanych

(Cetirizini dihydrochloridum)

Opis produktu:

Allertec WZF to lek do stosowania w objawach sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa oraz w pokrzywce. Zawartą w leku cetyryzynę można stosować u osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

- **Substancją czynną jest** - cetyryzyny dichlorowodorek.
- **Substancje pomocnicze** - laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.

1 tabletkę powlekaną zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodoreku (Cetirizini dihydrochloridum).

Wskazania:

Lek Allertec WZF stosuje się:

- w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak zatkały nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie, swędzenie oczu),
- w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwałe utrzymujące się, silnie swędzące bąble na skórze).

Działanie:

- Przeciwalergiczne.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dzieci w wieku 6-12 lat** - pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.
- **Dorośli i młodzież powyżej 12 lat** - 1 tabletki (10 mg) raz na dobę.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku, ale tabletki należy połykać popijając szklanką wody. Czas trwania leczenia jest indywidualny, jednakże bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować Allertecu WZF dłużej niż 10 dni.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie stosować leku Allertec WZF w przypadku nadwrażliwości na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub na którykolwiek ze składników pomocniczych leku.
- Przeciwwskazaniem do zastosowania tabletek Allertec WZF są ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednakże należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w przypadku wystąpienia:

- reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna, która powoduje obrzęk twarzy i gardła).

Często (rzadziej niż u 1 na 10 osób):

- zmęczenie,
- suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
- zawroty głowy, bóle głowy,
- senność,

- zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci).

Niezbyt często (rzadziej niż u 1 na 100 osób):

- ból brzucha,
- astenia (bardzo silne osłabienie), złe samopoczucie,
- parestezja (zaburzenia czucia),
- pobudzenie,
- świąd, wysypka.

Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

- tachykardia (przyspieszone bicie serca),
- obrzęki,
- reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko),
- nieprawidłowa czynność wątroby,
- zwiększenie masy ciała,
- drgawki,
- zachowanie agresywne, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność,
- pokrzywka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi),
- zaburzenia akomodacji (dostosowania się oka do oglądania różnych przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach), niewyraźne widzenie, rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, kolisty ruchy gałek ocznych),
- omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), dyskineza (mimowolne ruchy),
- tiki (skurcze nawykowe),
- zaburzenia oddawania moczu (moczzenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu),
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła),
- wysypka polekowa.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- zwiększenie apetytu,
- próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem),

- koszmary senne,
- amnezja (utrata pamięci), zaburzenia pamięci,
- zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi),
- zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego),
- świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku,
- ból stawów,
- wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną,
- zapalenie wątroby.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nieznane są oddziaływania tego leku z innymi lekami.
- Podczas przyjmowania leku Allertec WZF, a także innych leków przeciwhistaminowych pacjent powinien unikać spożywania alkoholu, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa w przypadku jednoczesnego stosowania większych dawek cetyryzyny i alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- **Lek zawiera laktozę** - nie stosować u pacjentów wykazujących nietolerancję niektórych cukrów.
- Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, konieczne może być zastosowanie mniejszej dawki leku.
- Przed zastosowaniem leku, należy poradzić się lekarza w przypadku występującej padaczki lub napadów drgawek w przeszłości, trudności z oddawaniem moczu.
- **Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leków przeciwalergicznych.**

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

-

Pacjent powinien zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek i w przypadku wystąpienia senności lub uczucia zmęczenia nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.

U osób wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy jak np. z silnymi lekami przeciwbólowymi, uspokajającymi lub z alkoholem może nasilać wpływ leku Allertec WZF na zdolność reagowania i koncentracji.

Wpływ na badania laboratoryjne:

- Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Polfa Warszawa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.