

Alugastrin, smak miętowy, nadkwaśność żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, 40 tabletek



Cena: 19,56 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Urgo
Substancja czynna	Dihydroxyaluminii natrii carbonas
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Alugastrin 340 mg - 40 tabletek

Smak miętowy

(Dihydroxyaluminii natrii carbonas)

Opis produktu:

Tabletki do rozgryzania Alugastrin to lek na zgagę (nadkwaśność soku żołądkowego) oraz łagodzący uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy. Alugastrin zobojętnia nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym, ale nie powoduje jego wtórnego pobudzenia. Produkt leczniczy przeznaczony do krótkotrwałego stosowania u dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład:

- Substancją czynną leku jest dihydroksyglinowo-sodowy węglan (Dihydroxyaluminii natrii carbonas).
- Substancje pomocnicze: mannitol, skrobia ziemniaczana, karmeloza sodowa, magnezu stearynian, substancja poprawiająca

smak i zapach miętowa, sacharyna sodowa.

1 tabletkę zawiera 340 mg dihydroksyglinowo-sodowego węgla.

Wskazania:

- nadkwaśność soku żołądkowego
- uszkodzenia błony śluzowej żołądka i dwunastnicy wywołane przez czynniki wrzodotwórcze
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Działanie:

- zobojętniające nadmiar kwasu solnego w soku żołądkowym
- osłaniające na błonę śluzową przetyku, żołądka i dwunastnicy

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:

- 1 lub 2 tabletki do rozgryzienia lub żucia na godzinę po posiłkach i przed snem lub w razie wystąpienia dolegliwości.

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu, jeśli kiedykolwiek wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu

Nie stosować leku Alugastrin:

- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć
- długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii (glin zawarty w leku wiąże w jelicie cienkim fosforany, tworząc nierozpuszczalne związki)
- lek zawiera w 1 dawce 162 mg sodu, co należy uwzględnić w przypadku pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u osób kontrolujących zawartość sodu w diecie
- jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku
- lek może powodować reakcje alergiczne

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

- kredowy posmak,
- łagodne zaparcia,
- skurcze żołądka.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

- nudności lub wymioty,
- białawe zabarwienie kału.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

- ciągłe zaparcia,
- utrata apetytu,
- niezwykła utrata masy ciała,
- osłabienie mięśni,
- utrata fosforanów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosować ostrożnie u pacjentów ze skłonnością do zaparć.
- Długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku może doprowadzić do hipofosfatemii.
- Alugastrin zawiera sód, należy wziąć pod uwagę u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

- Wskazane jest przyjmowanie leku po posiłkach lub między posiłkami.

Ciąża i karmienie piersią

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Podczas ciąży (zwłaszcza w I trymestrze) i karmienia piersią, lek może być stosowany jedynie w przypadku uzasadnionej konieczności. Nie stosować długotrwałe ani w dużych dawkach.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- U dzieci poniżej 6 lat można zastosować tylko po rozpoznaniu przez lekarza przyczyny dolegliwości.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Alugastrin może wchodzić w interakcje z:

- lekami zmniejszającymi wydzielanie kwasu żołądkowego,
- lekami stosowanymi w leczeniu zakażeń bakteryjnych układu oddechowego,
- lekami stosowanymi w niewydolności serca,
- lekami o działaniu przeciwgorączkowym, przeciwbólowym i przeciwzapalnym,
- lekami stosowanymi w leczeniu niedokrwistości spowodowanej niedoborami żelaza.

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- chronić przed światłem i wilgocią
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Podmiot odpowiedzialny:

Urgo Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie, Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.