

## Apap Extra, paracetamol + kofeina, 50 tabletek



Cena: 39,50 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Usp zdrowie
Substancja czynna	Paracetamol, Coffeinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Apap Extra, 500 mg + 65 mg - 50 tabletek

(Paracetamol + Coffeinum)

### Opis produktu:

Lek Apap Extra jest preparatem o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, przeznaczonym dla dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

### Skład:

- Substancja czynna - paracetamol, kofeina
- Substancje pomocnicze - powidon, skrobia kukurydziana, metyloceluloza, talk, wapnia stearynian. W skład otoczki tabletki wchodzi: hypromeloza 5, hypromeloza 15, makrogol 3350.

1 tabletkę powlekaną zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

### Wskazania:

Bóle różnego pochodzenia:

- głowy (w tym napięciowe bóle głowy)

- menstruacyjne
- zębów
- mięśni
- kostno-stawowe
- gardła
- nerwobóle
- oraz gorączka, np. w przeziębieniu i grypie

## Działanie:

- Przeciwbólowe,
- przeciwgorączkowe,
- Dodatek kofeiny powoduje wzmocnienie działania (synergizm) przeciwbólowego paracetamolu.
- Ponadto, kofeina działa umiarkowanie pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:** 1 lub 2 tabletki co 4 do 6 godz. (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- jeśli występują następujące schorzenia: niedokrwistość hemolityczna, wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność wątroby lub nerek, zaburzenia rytmu serca;
- podczas leczenia inhibitorami MAO i w okresie do 2 tygodni od zaprzestania przyjmowania tych leków.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 1 000 osób):**

- skórne reakcje uczuleniowe, nudności, wymioty, bóle brzucha.

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób):**

- ciężkie reakcje skórne, małopłytkowość objawiająca się wybroczynami i skłonnością do siniaków, agranulocytoza (brak jednego rodzaju białych krwinek objawiająca się podatnością na zakażenia), zawroty głowy, martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania; kolka nerkowa.

W przypadku, gdy lek zawierający kofeinę będzie podawany w zalecanym dawkowaniu w połączeniu z kofeiną zawartą w pożywieniu możliwe jest nasilenie objawów niepożądanych związanych ze wzrostem całkowitej dawki kofeiny takich jak:

**Częstość nieznaną:**

niemiarowość rytmu serca, bezsenność, zaburzenia uwagi, drżenia mięśniowe, drażliwość, zawroty głowy.

**Interakcje:**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Leku nie powinno się stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i/lub kofeinę.

**Przed przyjęciem leku należy zasięgnąć opinii lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje jednocześnie:**

- doustne leki przeciwcukrzycowe,
- leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, kumaryna),
- ryfampicynę (lek stosowany w leczeniu gruźlicy),
- leki przeciwpadaczkowe,
- leki uspokajające i nasenne,
- inhibitory MAO (leki stosowane m.in. w depresji),
- zydowudynę (lek przeciwwirusowy, stosowany w zakażeniu wirusem HIV),
- leki sympatykomimetyczne (tj. zmniejszające przekrwienie, hamujące apetyt i leki psychostymulujące podobne do amfetaminy),
- niesterydowe leki przeciwzapalne,
- hormony tarczycy,
- doustne środki antykoncepcyjne,
- cymetydynę (lek stosowany głównie w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy),
- chloramfenikol (antybiotyk),
- chinolony (leki o działaniu bakteriobójczym)
- werapamil (lek stosowany w chorobach serca).

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

- Lek zawiera paracetamol. Ze względu na ryzyko przedawkowania należy sprawdzić, czy wśród innych przyjmowanych leków nie ma takich, które również zawierają paracetamol.

- Stosowanie tego leku przez osoby cierpiące na niewydolność wątroby, nadużywające alkoholu lub głodzone stwarza szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby.
- **Lek należy ostrożnie stosować u osób z:** niewydolnością nerek, astmą oskrzelową, nadczynnością gruczołu tarczowego, zaburzeniami snu w postaci bezsenności.
- Ze względu na zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby, w czasie przyjmowania leku Apap Extra nie wolno pić alkoholu.

#### Dzieci i młodzież:

- Nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat (ograniczenie wynika z postaci leku).

#### Ciąża, karmienie piersią:

- 

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C

## Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.