

Apap Migrena, doraźne leczenie bólu x 20 tabletek



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	US Pharmacia
Substancja czynna	Acidum acetylsalicylicum, Paracetamolum, Coffeinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Apap Migrena - 20 tabletek powlekanych

(Paracetamolum 250 mg + Acidum acetylsalicylicum 250 mg + Coffeinum 65 mg)

Opis produktu:

APAP migrena to trójskładnikowy lek, który zawiera paracetamol, kwas acetylosalicylowy i kofeinę

APAP migrena stosuje się u dorosłych do doraźnego leczenia bólów głowy, w tym migren

Skład:

- **substancja czynna** - paracetamol, kwas acetylosalicylowy, kofeina
- **substancje pomocnicze** - celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropylceluloza niskopodstawiona, kwas stearynowy 50. Otoczka: Forcoat White W010 (hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, kwas benzoesowy), wosk Carnauba

1 tabletkę powlekaną zawiera: 250 mg paracetamolu, 250 mg kwasu acetylosalicylowego, 65 mg kofeiny

Wskazania:

- doraźnie u dorosłych do leczenia bólu głowy oraz migren (często towarzyszy im nadwrażliwość na światło, dźwięki, nudności, uniemożliwienie normalnego funkcjonowania) z aurą i bez aury

Działanie:

- **paracetamol** - działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo
- **kwas acetylosalicylowy** - wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe z tym, że dodatkowo ma właściwości przeciwzapalne
- **kofeina** - zawarta w leku ma za zadanie delikatnie pobudzić oraz wzmocnić działanie przeciwbólowe pozostałych substancji czynnych

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leczenie bólu głowy:

- w przypadku pojawienia się bólu głowy należy wziąć 1 tabletkę i popić ją pełną szklanką wody
- w razie konieczności kolejną tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej
- w przypadku bardziej intensywnego bólu głowy można wziąć jednorazowo 2 tabletki, w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4 – 6 godzin od zażycia dwóch pierwszych tabletek
- nie należy stosować leku Apap Migrena w bólu głowy przez dłużej niż 4 dni bez konsultacji z lekarzem

Leczenie migreny:

- w przypadku wystąpienia objawów migreny lub aury migrenowej należy przyjąć 2 tabletki leku popijając je szklanką wody
- w razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki zachowując 4-6 godzinny odstęp między dawkami
- nie należy stosować leku Apap migrena dłużej niż przez 3 dni w migrenie bez konsultacji z lekarzem
- zarówno w leczeniu bólu głowy, jak i migreny nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek w ciągu doby, co odpowiada dawce 1500 mg kwasu acetylosalicylowego, 1500 mg paracetamolu i 390 mg kofeiny
- długotrwałe stosowanie leku bez nadzoru lekarza może być szkodliwe dla zdrowia
- nie należy przekraczać zalecanej dawki
- należy stosować możliwie najniższą skuteczną dawkę leku, przez możliwie najkrótszy czas

Przeciwwskazania:

- APAPu migrena nie powinno się stosować jeżeli występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którykolwiek ze składników leku. Także jeśli stwierdzono wcześniej reakcje alergiczne na inne leki przeciwbólowe, przeciwzapalne lub przeciwgorączkowe (NLPZ np. kwas acetylosalicylowy i salicylany, diklofenak, ibuprofen)
- Leku nie powinno się również stosować u pacjentów z owrzodzeniem żołądka, jelit, lub jeżeli w przeszłości występowało owrzodzenie układu pokarmowego, jeżeli występuje krew w stolcu lub czarne stolce (objawy krwawienia lub perforacji żołądkowo-jelitowych), w przypadku hemofilii lub występowania innych chorób krwi, w ciężkich schorzeniach serca, wątroby lub nerek, podczas przyjmowania ponad 15 mg metotreksatu tygodniowo oraz w trzecim trymestrze ciąży

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby

- należy poinformować lekarza o chorobach wątroby i nerek
- lekarz może zlecić stosowanie innych niż zalecane, przerw między kolejnymi dawkami leku lub inny czas leczenia lekiem APAP Migrena
- nie należy stosować leku APAP Migrena u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku APAP Migrena i poinformować lekarza w przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, takich jak:

- reakcje alergiczne takie jak opuchnięcie twarzy, ust, jamy ustnej, języka, lub gardła (objawy te mogą utrudniać połykanie, powodować świszczący oddech, trudności w oddychaniu, uczucie ucisku w klatce piersiowej (objaw astmy). Może także pojawić się wysypka, swędzenie i omdlenia)
- Zaczerwienienie skóry, pęcherze na wargach, spojówkach lub w jamie ustnej, łuszczenie się skóry lub owrzodzenie jamy ustnej.
- krwawienie z żołądka lub jelit, owrzodzenie żołądka lub jelit. Objawom tym może towarzyszyć ostry ból brzucha, krwawe lub czarne stolce lub krwawe wymioty (Objawy te mogą nie być poprzedzone objawami ostrzegawczymi i mogą wystąpić podczas stosowania wszystkich NLPZ, na każdym etapie leczenia i mogą prowadzić do śmierci. Ryzyko to jest szczególnie duże u osób starszych)
- zażółcenie skóry lub oczu (objawy niewydolności wątroby)
- zawroty głowy lub uczucie „lekkiej głowy” (objaw niskiego ciśnienia krwi)
- nieregularne bicie serca
- jeśli u pacjenta wystąpiły problemy z oddychaniem po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych i wystąpiła podobna reakcja po zastosowaniu tego produktu
- siniaki lub krwawienie o nieznanym przyczynie
- wzrost liczby krwawień z nosa lub zasinień
- obrzęki lub zatrzymanie wody
- dzwonienie w uszach lub chwilowy zanik słuchu
- zmiany w zachowaniu, mdłości i wymioty (może to być oznaka zespołu Reye'a)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie należy poinformować lekarza, w przypadku przyjmowania któregokolwiek z poniższych leków:

- inne leki zawierające paracetamol, kwas acetylosalicylowy lub jakiegokolwiek inne leki przeciwbólowe/przeciwgorączkowe
- leki przeciwzakrzepowe, takie jak doustne środki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna), heparyna, leki trombolityczne (np.

streptokinaza), lub inne leki przeciwplatekcyjne (np. tyklopidyna, kloprodogrel, cylostazol)

- kortykosteroidy
- barbiturany i benzodiazepiny
- lit, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub fluwoksamina
- sulfonilomocznik lub insulinę
- metotreksat
- niektóre leki stosowane w leczeniu zakażeń (np. ryfampicyna, izoniazyd, chloramfenikol cyprofloksacyna, lub kwas pipemidowy)
- lewotyroksyna
- metoklopramid
- leki stosowane w leczeniu padaczki
- leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca
- diuretyki
- leki stosowane w leczeniu skazy moczanowej
- doustne środki antykoncepcyjne
- zydowudyna
- leki opóźniające opróżnianie żołądka, takie jak propantelina
- klozapina
- leki sympatykomimetyczne
- leki przeciwalergiczne
- teofilina
- terbinafina
- cymetydyna
- disulfiram
- nikotyna
- kolestyramina
- flukloksacylina

Dzieci i młodzież:

- leku nie należy stosować u osób poniżej 18 roku życia

Ciąża, karmienie piersią:

- **APAP migrena** nie jest zalecany do stosowania u kobiet w ciąży w szczególności w trzecim trymestrze (może dojść do uszkodzenia płodu, trudności w trakcie porodu)

- nie zaleca się również stosowania leku u kobiet karmiących może on zaszkodzić niemowlęciu

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- brak danych na temat wpływu leku APAP migrena na zdolność do prowadzenia pojazdów. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności, nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać urządzeń mechanicznych

Wpływ na badania laboratoryjne:

- **APAP migrena** może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych, dlatego jeżeli będzie wykonywane badanie krwi, moczu lub inne badanie laboratoryjne należy pamiętać o poinformowaniu lekarza o stosowaniu leku APAP migrena

Stosowanie leku z jedzeniem i pićiem:

- składniki leku (paracetamol i kwas acetylosalicylowy) mogą powodować uszkodzenia wątroby i krwawienia z żołądka. Jeśli spożywa się alkohol, należy się skonsultować z lekarzem czy można stosować lek
- zalecana dawka leku zawiera ilość kofeiny jaka zwarta jest w około jednej filiżance kawy. Należy wziąć to pod uwagę przy przyjmowaniu kofeiny z innych źródeł

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

US Pharmacia Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd,

poinformuj nas o tym.