

Bilastyna Hitaxa 20 mg x 10 tabletek



Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Adamed Pharma

Substancja
czynna Bilastinum

Typ produktu

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Bilastyna Hitaxa 20 mg - 10 tabletek

(Bilastinum)

Opis produktu:

Lek **Bilastyna Hitaxa** jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i spojówek (sezonowego i całorocznego) oraz pokrzywki.

Skład:

- Substancją czynną jest: Bilastinum
- Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokryształiczna, krospowidon (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian

Jedna tabletką zawiera 20 mg bilastyny

Wskazania:

- łagodzenie objawów kataru siennego i innych postaci alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa
- leczenie swędzących wysypek skórnych (pokrzywki)

Działanie:

- **Bilastyna Hitaxa** jest lekiem o działaniu przeciwhistaminowym
- **Bilastyna** jest niesedatywnym, długo działającym antagonistą histaminy z selektywnym powinowactwem do obwodowych receptorów H1

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli osoby w podeszłym wieku i dzieci od 12 roku życia:

- 1 tabletkę na dobę. Tabletkę przyjmować na 1 godzinę po jakimkolwiek posiłku lub po wypiciu soku owocowego

Tabletkę należy połknąć popijając szklanką wody

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- jeżeli u pacjenta wystąpią objawy reakcji alergicznych (częstość nieznana), w tym: trudności w oddychaniu, zawroty głowy, zapaść lub utrata świadomości, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i (lub) obrzęk i zaczerwienienie skóry, należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Często (występujące częściej niż u 1 na 100, ale rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

- bóle głowy
- senność

Niezbyt często (występujące częściej niż u 1 na 1000, ale rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

- nieprawidłowy zapis EKG
- zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności wątroby
- zawroty głowy
- ból żołądka
- zmęczenie
- wzmożony apetyt
- zaburzenia rytmu serca
- zwiększenie masy ciała

- nudności
- lęk
- uczucie suchości lub dyskomfortu w nosie
- ból brzucha
- biegunka
- zapalenie żołądka
- zawroty głowy (zawroty lub uczucie wirowania)
- osłabienie
- wzmożone pragnienie
- duszność (trudności w oddychaniu)
- suchość w jamie ustnej
- niestrawność
- świąd
- opryszczka na twarzy
- gorączka
- szumy uszne (dzwonienie w uszach)
- zaburzenia snu
- zmiany w badaniach krwi wskazujące na zaburzenia czynności nerek
- podwyższone stężenie lipidów we krwi

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- kołatanie serca (uczucie bicia serca)
- częstoskurcz (szybkie bicie serca)
- wymioty

Działania niepożądane, które mogą występować u dzieci, to:

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

- zapalenie błony śluzowej nosa (podrażnienie nosa)
- alergiczne zapalenie spojówek (podrażnienie oczu)
- ból głowy

- ból żołądka (ból brzucha, ból w nadbrzuszu)

Niezbyt często (występujące rzadziej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

- podrażnienie oczu
- zawroty głowy
- utrata przytomności
- biegunka
- nudności
- obrzęk warg
- wyprysk
- pokrzywka
- zmęczenie

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

Szczególnie ważna jest informacja jeśli pacjent stosuje:

- ketokonazol (lek przeciwgrzybiczy), erytromycyna i ryfampicyna (antybiotyki), diltiazem (lek stosowany w dławicy piersiowej), cyklosporyna (lek stosowany w celu zmniejszenia aktywności układu odpornościowego, co pozwala uniknąć odrzucenia przeszczepu, lub w celu zmniejszenia aktywności choroby w przypadku chorób autoimmunologicznych i alergicznych, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry lub reumatoidalne zapalenie stawów)
- Rytonawir (lek stosowany w leczeniu AIDS)

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- należy zachować ostrożność zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy unikać wtedy jednoczesnego podawania bilastyny

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- nie należy stosować u dzieci i młodzieży wieku poniżej 12 roku życia

Stosowanie leku z jedzeniem i pić:

- leku Bilastyna Hitaxa nie należy przyjmować razem z jedzeniem ani z sokiem grejpfrutowym, ani innymi sokami owocowymi, ponieważ osłabia to działanie leku

Ciąża i karmienie piersią:

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- decyzję o zastosowaniu leku w ciąży lub okresie karmienia piersią podejmuje lekarz.

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A. Pieńków ul. Mariana Adamkiewicza 6A 05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym