

Chlorivag, infekcje intymne x 10 globulek



Cena: 27,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Kadefarm
Substancja czynna	-
Typ produktu	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Wyrób Medyczny

Chlorivag - 10 globulek dopochwowych

Skład:

jedna globulka 2 g zawiera:

- sól sodowa kwasu hialuronowego
- witamina E
- bromelaina
- dichlorowodorek chlorheksydyny (konserwant)
- półsyntetyczne glicerydy

Wskazania:

- terapia wspomagająca przed- i pooperacyjna w chirurgii ginekologicznej
- profilaktyka w nawrotach infekcji śluzówki pochwy o charakterze zapalnym, dystroficznym lub zakaźnym
- terapia wspomagająca w odbudowie prawidłowego nawilżenia śluzówki pochwy
- pomocniczo w przypadku świądu, zaczerwienień i podrażnień spowodowanych przez różnego rodzaju infekcje

- rekomendowany jest w przypadku zaczerwienienia, świądu i pieczenia z oznakami mikozy i waginozy

Działanie:

- **Chlorivag** działa zapobiegawczo i leczniczo w chorobach pochwy o charakterze zapalnym, infekcyjnym lub dystroficznym
- Kwas hialuronowy, posiadający właściwości wiązania do błony śluzowej, wykazuje działanie nawilżające i ochronne na śluzówkę pochwy

Sposób użycia:

- przed zastosowaniem globulki zawsze umyj ręce ciepłą wodą z mydłem
- wyjmij globulkę z folii poprzez jej wyciśnięcie
- trzymając globulkę kciukiem i palcem wskazującym, połóż się na plecach, unosząc kolana i rozchylając nogi. W tej pozycji delikatnie umieść globulkę palcem wskazującym w pochwie tak głęboko, jak to możliwe

Chlorivag globulki powinny być stosowane przed snem. 1 globulka dziennie przez 10 dni.

Przeciwwskazania:

- produkt wyłącznie do stosowania dopochwowego
- nie połykać
- nie używać w przypadku nadwrażliwości lub nietolerancji któregokolwiek ze składników produktu
- w przypadku ciąży bądź karmienia piersią globulki powinny być używane wyłącznie po zaleceniu lekarza lub farmaceuty
- produkt nie jest przeznaczony dla dzieci

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

Przechowywanie:

- chronić od światła
- przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
- przechowywać w temperaturze pokojowej
- chronić od światła i wilgoci
- przechowywać poza zasięgiem i wzrokiem dzieci.
- przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 5-30oC.

Ważne:

- Posiada oznakowanie CE 0477
- Posiada deklarację zgodności UE.
- Zawiera instrukcję obsługi w **języku polskim**.
- Zawiera etykietę oraz oznaczenia w **języku polskim**.