

Clotrimazolum GSK krem 0,01 g/g 20 g



Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	GlaxoSmithKline
Substancja czynna	Clotrimazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Clotrimazolum GSK 10mg/g 20 g krem

(Clotrimazolum)

Opis produktu:

Clotrimazolum GSK to produkt leczniczy do stosowania miejscowego w przypadku zakażeń grzybiczych skóry

Skład:

- substancją czynną jest - klotrymazol (Clotrimazolum)
- substancje pomocnicze - alkohol cetostearylowy, oktylododekanol, polisorbat 60, sorbitanu stearynian, olbrot syntetyczny, alkohol benzylowy, wodę oczyszczoną

1 g kremu zawiera 10 mg klotrymazolu

Wskazania:

- grzybica skóry rąk i stop, tułowia, podudzi i nóg wywołowanych przez dermatofity
- łupież pstry

- zakażenia skóry i błon śluzowych zewnętrznych narządów płciowych (warg sromowych oraz napletka i żołądzi) wywołanych przez drożdżaki (zakażenia takie zwane są także kandydozami)

Działanie:

- przeciwgrzybicze

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- krem należy nakładać cienką warstwą na zmienione chorobowo miejsca 2-3 razy na dobę
- krem należy stosować jednocześnie na wszystkie zakażone miejsca
- lek należy stosować na skórę przez okres 2-4 tygodni, nawet jeśli objawy choroby ustąpią

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- ciąża
- laktacja
- klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu, a tym samym osłabiać ich skuteczność

Działania niepożądane:

Z częstością nieznaną mogą wystąpić:

- reakcje uczuleniowe takie jak: duszności, zbyt niskie ciśnienie krwi, omdlenie, pokrzywka
- reakcje miejscowego podrażnienia skóry, świąd, wysypka, pęcherze, złuszczenie się naskórka, uczucie bólu lub dyskomfortu, pieczenie, kłucie, obrzęk, rumień. W przypadku nasilenia się objawów podrażnienia lub gdy objawy podrażnienia nie ustąpią po kilku dniach, należy zaprzestać stosowania leku

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- klotrymazol stosowany miejscowo na błony śluzowe zewnętrznych narządów płciowych może uszkadzać mechaniczne środki antykoncepcyjne wykonane z lateksu takie jak: prezerwatywy i krążki domaciczne, a tym samym zneutralizować ich skuteczność. Dlatego w czasie leczenia klotrymazolem i przez co najmniej 5 dni po jego zakończeniu, zaleca się stosować inne środki antykoncepcyjne. Należy skontaktować się z lekarzem w celu wyboru innej metody zapobiegania ciąży

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- nie stosować na rany i uszkodzoną skórę
- nie odnotowano przypadków przedawkowania w przypadku stosowania zgodnie ze wskazaniami oraz zalecanym dawkowaniem i sposobem użycia

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- składniki leku Clotrimazolum GSK mogą przenikać do mleka matki.
- jeśli kobieta karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.