

Contrahist, Allergy, pokrzywka, katar alergiczny 5mg x 10 tabletek



Cena: 9,30 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Adamed
Substancja czynna	Levocetirizine
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Contrahist Allergy lek przeciwalergiczny - 10 tabletek powlekanych

(Levocetirizini dihydrochloridum)

Opis produktu:

Contrahist Allergy to produkt leczniczy do stosowania w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, pokrzywce

Skład:

- **substancja czynna:** lewocetyryzyna w postaci dichlorowodorku
- **Substancje pomocnicze:** celuloza mikrokryształiczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400

1 tabletkę zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (4,2 mg lewocetyryzyny)

Wskazania:

- objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa)

- przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat

Działanie:

- działanie przeciwalergiczne
- lewocetyryzyna jest blokerem receptorów H1 dla histminy

Dawkowanie:

lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

- lek do stosowania doustnego
- nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem
- jeśli po 3 dniach stosowania leku, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej - należy skonsultować się z lekarzem
- tabletkę należy przyjmować w całości, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku

Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

- 1 tabletkę (5 mg) na dobę

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek przeciwalergiczny lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensiem kreatyniny mniejszym niż 10ml/min)
- jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy

Działanie niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Objawy nadwrażliwości:

- obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła
- trudności w oddychaniu lub przełykaniu oraz pokrzywka
- obrzęk naczynioruchowy

- nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu

Często (rzadziej niż 1 na 10, ale częściej niż 1 na 100 pacjentów):

- suchość w jamie ustnej
- bóle głowy
- zmęczenie i senność, przeważnie o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

Niezbyt często (rzadziej niż 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 pacjentów):

- uczucie wyczerpania
- bóle brzucha

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- u wrażliwych pacjentów spożywanie alkoholu podczas stosowania lewocetyryzyny może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego. Wskazane jest zachowanie ostrożności w przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Contrahist Allergy i alkoholu

Przechowywanie:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie zamrażać
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Pharma S.A. Pieńków ul. Adama Mickiewicza 6A 05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

