

## Mensil Max, 50 mg syldenafil, 4 tabletki



Cena: 24,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Sildenafilum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Mensil Max 50 mg - 4 tabletki do rozgryzania i żucia

(Sildenafilum)

### Opis produktu:

Mensil to produkt leczniczy stosowany w leczeniu zaburzeń wzrodu u dorosłych mężczyzn. Działanie leku Mensil polega na zwiększaniu napływu krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

### Skład:

- substancję czynną: syldenafil
- pozostałe składniki: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH).

Jedna tabletką leku zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).

## Wskazania:

Leczenie zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn.

## Działanie:

Mensil zawiera substancję czynną sildenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

- Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.
- Sildenafil pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza albo farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli:** w przypadku stosowania wcześniej przez pacjenta leku zawierające sildenafil w dawce 50 mg lub większej - zalecana dawka to 50 mg.
- Jeżeli pacjent nie stosował wcześniej tak dużej dawki to lek Mensil Max można zażyć w dawce 50 mg tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu sildenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu, tzn. nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku.
- **Leku Mensil nie należy stosować częściej niż raz na dobę.**
- Lek Mensil **należy przyjmować na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.** Tabletkę należy rozgryźć i żuć. Tabletki nie wymagają popijania.

## Przeciwwskazania:

- Uczulenie na sildenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przyjmuje azotany, leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers) oraz riocyguat.
- Ciężkie choroby serca i wątroby.
- Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz niskie ciśnienie tętnicze krwi.
- Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (tzw. retinitis pigmentosa).
- Stwierdzona kiedykolwiek utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (tzw. NAION).

## Możliwe działania niepożądane:

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):**

- ból głowy

**Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):**

- nudności, zawroty głowy,
- nagłe zaczerwienienie twarzy,
- uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
- niestrawność
- widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa.

**Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):**

- wymioty,
- wysypka skórna,
- podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
- kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie,
- bóle mięśni,
- senność, osłabione czucie dotyku,
- dzwonięcie w uszach, suchość w jamie ustnej,
- zatkanie lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha,
- krew w moczu,
- ból rąk lub nóg,
- krwawienie z nosa,
- uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.

**Rzadko (może wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):**

- omdlenia,
- udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
- uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
- krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
- krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
- suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości
- nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Inventum należy poradzić się lekarza lub farmaceuty:

Jeśli w czasie stosunku płciowego lub po nim wystąpią bóle w klatce piersiowej:

- należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,
- nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej,
- zasięgnąć pomocy medycznej.

Nie należy przyjmować leku Mensil razem z innymi lekami zawierającymi sildenafil.

**Stosowanie leku z jedzeniem, pić oraz alkoholem:**

Lek Mensil może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Jednakże przyjmowanie leku Mensil w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu.

**Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:**

Lek Mensil nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

Lek Mensil może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Mensil.

**Dzieci i młodzież:**

Leku Mensil nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

- Lek Mensil zawiera laktozę.
- Lek Mensil zawiera aspartam.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek, ul. Żmigrodzka 242 E, 51-131 Wrocław.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.