

Miconal, 20mg/g, żel, grzybica, skóry, paznokci, 30g



Cena: 22,59 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Miconazolum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Miconal, 20 mg/g, żel - 30 g

(Miconazolum)

Opis produktu:

Miconal jest lekiem przeciw-grzybiczym przeznaczonym do stosowania miejscowego, na skórę.

Skład:

- Substancją czynną leku jest mikonazoli.
- Substancje pomocnicze to: dimetylosulfotlenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, glikol propylenowy, hyaroksypropylo-celuloza. etanol 96%.

1 g żelu zawiera 20 mg mikonazolu.

Wskazania:

Stosowany miejscowo:

- w grzybiczych zakażeniach skóry i paznokci;

- w grzybicach wtórnie zakażonych przez bakterie.

Działanie:

- Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę.
- O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nakładać cienką warstwę żelu (około 1 mm) na chorobowo zmienioną powierzchnię skóry dwa razy na dobę (rano i wieczorem). Na chorobowo zmienioną powierzchnię paznokci żel nakładać raz lub dwa razy na dobę. Po każdym nałożeniu żelu należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.
- Czas leczenia wynosi zwykle 2 do 6 tygodni, w zależności od umiejscowienia i nasilenia zmian chorobowych.
- Po ustąpieniu wszystkich objawów i zmian chorobowych, leczenie należy jeszcze kontynuować przez co najmniej 1 tydzień.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na którykolwiek ze składników leku.
- Nie stosować na błony śluzowe i zranioną skórę.
- Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane po stosowaniu żelu Miconal pojawiają się bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

- nagły świszczący oddech, obrzęk ust, twarzy lub ciała, wysypka, omdlenie lub trudności w połykaniu (ciężka reakcja alergiczna)
- pokrzywka, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, rumień, świąd, uczucie palenia na skórze, podrażnienie skóry w miejscu stosowania leku.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Pacjenci przyjmujący doustne leki przeciwzakrzepowe (np. warfaryna) muszą zachować ostrożność.
- Jednoczesne stosowanie leku Miconal z innymi lekami np. doustnymi lekami przeciw cukrzycowymi i fenytoiną (lek o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwyrtmicznym) może nasilić działanie i objawy niepożądane tych leków.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Dimastin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

- Jeśli kiedykolwiek w przeszłości wystąpiło uczulenie na mikonazol lub inny lek przeciwgrzybiczy, przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
- Zbyt częste stosowanie leku może powodować podrażnienie skóry, które ustępuje zwykle po zaprzestaniu stosowania leku.
- Lek Miconal jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na skórę, nie do stosowania doustnego. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w razie przypadkowego spożycia leku - lekarz może zalecić zastosowanie odpowiedniej metody opróżnienia żołądka.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Należy unikać stosowania leku Miconal w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna inaczej.
- O stosowaniu leku u matek karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

- Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Przechowywanie:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
- Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i tubie.
- Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

-

POLFA TARCHOMIN, A. Fleminga 2, Warszawa

Dodatkowe informacje:

- Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż

każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.