

# Otrivin, Katar i Zatoki, aerozol do nosa 10 ml



Cena: 33,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	GlaxoSmithKline
Substancja czynna	Xylometazolinum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Otrivin Katar i Zatoki aerozol do nosa - 10 ml

(Xylometazolini hydrochloridum 1 mg/ml)

#### Opis produktu:

Otrivin Katar i Zatoki to produkt leczniczy, który ułatwia oddychanie podczas kataru (także siennego, alergicznego), przeziębienia, zapalenia błony śluzowej nosa czy zatok. Dodatek **mentolu** oraz **eukaliptolu** powoduje uczucie chłodu na błonach śluzowych.

Otrivin Katar i Zatoki działa już po 2 minutach i przez kolejne 12 godzin. Produkt leczniczy jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania dla dzieci powyżej 12 lat i osób dorosłych.

Otrivin Katar i Zatoki nie zawiera substancji konserwujących

#### Skład:

1 ml roztworu zawiera 1 mg xylometazoliny chlorowodoru

•

**Substancje pomocnicze:** sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, disodu edetynian, lewomentol, cyneol (eukaliptol), sorbitol, makroglicerolu hydroksystearnian, woda oczyszczona

## Wskazania:

- w nadmiernym przekrwieniu błony śluzowej nosa występującym w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok
- wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego

## Działanie:

- **Otrivin Katar i Zatoki** powoduje zwężenie naczyń krwionośnych w nosie dzięki czemu zmniejsza się przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa oraz sąsiadującej części gardła

Produkt leczniczy powoduje także hamowanie objawów związanych z nadmiernym wydzielaniem śluzu i ułatwia odpływ zablokowanej wydzieliny

- 

Ponadto dodatek mentolu i eukaliptusa wywołuje uczucie chłodzenia na błonie śluzowej

## Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

**Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:**

- 1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę

Zaleca się, aby ostatnią dawkę leku przyjąć bezpośrednio przed snem

**Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem**

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek ksylometazoliny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli pacjent przeżył operację wykonywaną przez nos lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej

- jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania
- jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa)

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

### Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 osób):

- suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, pieczenie w miejscu podania
- nudności
- ból głowy

### Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (u 1 na 10 000 osób):

- reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie)
- przemijające zaburzenia widzenia
- niemiarowa lub przyspieszona czynność serca

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

### Otrivin Katar i Zatoki nie należy stosować w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji:

- inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO); nie stosować produktu leczniczego także jeśli w ciągu ostatnich 14 dni były przyjmowane IMAO
- trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

- podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi
- choroby serca (np. zespół długiego odstępu QT)
- nadczynności tarczycy
- cukrzycy
- rozrostu gruczołu krokowego
- łagodnego nowotworu nadnercza

- przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni
- u wrażliwych pacjentów Otrivin Katar i Zatoki może powodować bezsenność, zawroty głowy, drżenie, zaburzenia rytmu serca i podwyższone ciśnienie tętnicze

**Stosowanie leku przez okres dłuższy niż 10 dni lub w dawkach większych niż zalecane, może spowodować nasilenie objawów lub ich nawrót**

#### **Ciąża i karmienie piersią:**

- jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku
- nie stosować Otrivin Katar i Zatoki w czasie ciąży
- w okresie karmienia piersią Otrivin Katar i Zatoki można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem

#### **Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:**

- nie stosować u dzieci poniżej 12 lat

#### **Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

- Otrivin Katar i Zatoki stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

## **Przechowywanie:**

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

## **Podmiot odpowiedzialny:**

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań

## **Dodatkowe informacje:**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.