

Proktosedon x 12 czopków



Cena: 50,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Polmex
Substancja czynna	Hydrocortisonum, Cinchocainum, Aesculinum, Neomycinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Proktosedon - 12 czopków doodbytniczych

Opis produktu:

Leczenie hemoroidów zewnętrznych i wewnętrznych.

Skład:

Substancją czynną jest:

- hydrokortyzon (Hydrocortisonum)
- cynchokaina (Cinchocaini hydrochloridum)
- neomycyna (Neomycini sulfas)
- eskulina (Esculinum)

substancje pomocnicze: parafina ciekła, wazelina biała, lanolina bezwodna.

1 czopek zawiera:

- 5mg - hydrokortyzonu w postaci octanu (Hydrocortisonum)
- 5mg - chlorowodoru cynchokainy (Cinchocaini hydrochloridum)

- 10mg **siarczanu neomycyny** (Neomycini sulfas)
- 10mg **eskuliny w postaci półtorawodzianu**

Wskazania:

- leczenie hemoroidów zewnętrznych
- leczenie hemoroidów wewnętrznych
- ostre i przewlekłe stany zapalne odbytu
- szczelina odbytu
- świąd odbytu
- okres przed- i pooperacyjny

Działanie:

- **hydrokortyzon** - działa przeciwzapalnie
- **cynchokaina** - miejscowo znieczulająco
- **neomycyna** - antybiotyk zapobiega wtórnym zakażeniom i leczy miejscowe zakażenia wywołane przez gronkowce i wrażliwe bakterie Gram-ujemne
- **eskulina** - hamuje krwawienia z naczyń i zmniejsza obrzęki. Lek zmniejsza objawy występujące w żylakach odbytu, tj. stan zapalny, ból, obrzęk i krwawienie

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- lek stosuje się rano i wieczorem oraz po każdym wypróżnieniu
- lek do stosowania doodbytniczego i na zewnątrz odbytu
- lek stosuje się zwykle 3-6 dni do ustąpienia stanu zapalnego
- maść stosuje się z użyciem aplikatora

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli pacjent cierpi na: jaskrę, osteoporozę, zakażenia grzybicze lub wirusowe, cukrzycę, gruźlicę, zakrzepicę żylną.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

Sporadycznie występujące działania niepożądane:

- pieczenie odbytu (szczególnie gdy naskórek jest uszkodzony).

Częstość nieznaną:

- podczas długotrwałego stosowania mogą wystąpić działania ogólnoustrojowe charakterystyczne dla steroidów (w leku występuje hydrokortyzon)
- nieostre widzenie
- pieczenie odbytu (szczególnie gdy naskórek jest uszkodzony)

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Proktosedon może wchodzić w interakcje z:

- NLPZ - niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, kwasem acetylosalicylowym
- fenytoiną
- szczepionkami (sterydy mogą obniżać poziom przeciwciał, osłabiać odpowiedź immunologiczną po szczepieniu)
- rytonawirem
- kobicystatem

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli równoległe z hemoroidami występują: zakażenia, alergia
- Jeśli pacjent przyjmuje szczepienia lub leczenia immunizacyjne - nie stosować tego leku
- W przypadku wystąpienia podrażnienia, krwawienia, stosowanie leku należy przerwać
- Długotrwałe stosowanie może wiązać się z wystąpieniem ogólnoustrojowych działań kortykosteroidów
- W przypadku nieostrego widzenia lub innych zaburzeń widzenia, należy skontaktować się z lekarzem

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
- Leku nie stosować w okresie karmienia piersią ze względu na wpływ hydrokortyzonu na wzrost dziecka.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować leku u dzieci poniżej 12 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

- Nie badano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn
- W działaniach niepożądanych wymienione zostało nieostre widzenie

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polmex Pharma Biniński & Malinowski sp. j. ul. Pokorna 2 lok. 1027 00-199 Warszawa

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.