

Pyrantelum OWIX 250mg, na owsiki, 3 tabletki



Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka Polpharma

Substancja
czynna Pyrantelum

Typ produktu

Opis produktu

Lek bez recepty

Pyrantelum OWIX, 250 mg - 3 tabletki

(Pyrantelum)

Opis produktu:

Pyrantelum Owix jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej.

Skład:

- Substancja czynna - pyrantel
- Substancje pomocnicze - skrobia ziemniaczana, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna, etyloceluloza, magnezu stearynian, aromat pomarańczowy.

Każda tabletki zawiera 250 mg pyrantelu w postaci embonianu pyrantelu.

Wskazania:

- Owsica u dzieci w wieku od 6 lat i dorosłych, wywołana przez *Enterobius vermicularis*.
- Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

Działanie:

- Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych.
- Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit.
- Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków.
- Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Dawkę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
- Lek stosuje się doustnie w czasie lub po posiłku popijając wodą.
- Przed połknięciem tabletkę należy bardzo dokładnie rozgryźć lub rozkruszyć.

Dorośli i dzieci powyżej 6 roku życia:

- **Masia ciała 17-28 kg** - 1 tabletkę, 250 mg.
- **Masia ciała 29-39 kg** - 1,5 tabletki, 375 mg.
- **Masia ciała 40-50 kg** - 2 tabletki, 500 mg.
- **Masia ciała 51-62 kg** - 2,5 tabletki, 625 mg.
- **Masia ciała 63-75 kg** - 3 tabletki, 750 mg.
- **Dorośli o masie ciała powyżej 75 kg**: 4 tabletki, 1000 mg.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie stosować leku Pyrantelum Owix:

- Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.

Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

- nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia
- bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność
- wysypka
- osłabienie
- przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- parcie na stolec
- omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)
- gorączka
- zaburzenia słuchu.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Lek może zwiększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej) w osoczu.
- Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyrantelum Owix należy omówić to z lekarzem:

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).

Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymiw przeszłości, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża, karmienie piersią:

- Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Owix w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Owix u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie lekiem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

Stosowanie z jedzeniem i pićem:

Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Owix na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Polpharma S.A, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.