


# Pyrantelum OWIX, zawiesina, 250 mg/5 ml, na owsiki, 15 ml



Cena: 20,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent /  
Marka Polpharma

Substancja  
czynna Pyrantelum

Typ produktu

## Opis produktu

## Lek bez recepty

## Pyrantelum OWIX, zawiesina doustna, 250 mg/5 ml - 15 ml

(Pyrantelum)

## Opis produktu:

Pyrantelum OWIX jest lekiem przeciwpasożytniczym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych w leczeniu zakażenia jelitowego owsikami - robakami obłymi typu nicieni barwy białej.

## Skład:

- Substancja czynna - pyrantel
- Substancje pomocnicze - sodu benzoesan (E 211), karmeloza sodowa, sorbitol 70% (E 420), glicerol, glinu-magnezu krzemian, polisorbata 80, powidon, aromat morelowy, emulsja symetykonu, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 250 mg pyrantelu (w postaci pyrantelu embonianu).

## Wskazania:

- Owsica u dzieci w wieku od 2 lat i dorosłych, wywołana przez *Enterobius vermicularis*.
- Warunkiem zastosowania leku jest stwierdzenie występowania owsików w kale i (lub) okolicy odbytu.

## Działanie:

- Lek ten działa na mięśnie pasożytów jelitowych.
- Unieruchomione pasożyty zostają usunięte z jelita wskutek ruchów perystaltycznych jelit.
- Pyrantel nie podrażnia jelit ani nie wywołuje przemieszczania się robaków.
- Działa na formy dojrzałe i pasożyty we wczesnym stadium rozwoju, natomiast nie działa na larwy w trakcie ich migracji w tkankach.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek przyjmuje się doustnie, w trakcie lub niezależnie od posiłku.
- Przed użyciem wstrząsnąć do uzyskania jednorodnej zawiesiny.

**Zalecana dawka u dorosłych i dzieci od 2 lat o masie ciała od 11 kg to:** 11 mg/kg mc jednorazowo.

- Dawkę tę należy powtórzyć po dwóch lub trzech tygodniach od przyjęcia pierwszej dawki.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

**Nie stosować leku Pyrantelum Owix:**

- Jeśli pacjent ma uczulenie na pyrantel lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- Jeśli pacjent przyjmuje piperazynę.
- Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia miastenii (choroba mięśni szkieletowych).

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po zastosowaniu leku działania niepożądane nie występują często i przemijają po przerwaniu leczenia.

**Działania niepożądane występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):**

- nudności, wymioty, bóle i skurcze żołądka, biegunki, brak łaknienia
- bóle głowy, zawroty głowy, senność, bezsenność
- wysypka
- osłabienie
- przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów określających czynność wątroby).

**Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):**

- parcie na stolec
- omamy z dezorientacją, parestezje (uczucie drętwienia, mrowienia w kończynach)
- gorączka
- zaburzenia słuchu.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Lek może zwiększać stężenie teofiliny (stosowana w leczeniu astmy oskrzelowej) w osoczu.
- Leku nie należy stosować jednocześnie z piperazyną, gdyż działanie obu leków może ulec osłabieniu.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

**Przed rozpoczęciem stosowania leku Pyrantelum Owix należy omówić to z lekarzem:**

- jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli pacjent jest niedożywiony lub ma niedokrwistość (anemię).

Jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą pacjenta aktualnie lub są związane z sytuacjami występującymi w przeszłości, należy skontaktować się z lekarzem.

**Ciąża, karmienie piersią:**

- Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Owix w okresie ciąży. Jeśli leczenie jest konieczne, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania leku Pyrantelum Owix u kobiet karmiących piersią. Jeśli leczenie lekiem jest konieczne, należy w tym czasie zaprzestać karmienia piersią.

**Stosowanie z jedzeniem i pićem:**

Lek przyjmuje się w czasie lub po posiłku

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

Brak danych dotyczących wpływu leku Pyrantelum Owix na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Po otwarciu lek można przechowywać przez 21 dni.

## Podmiot odpowiedzialny:

Polpharma S.A, Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.