

Raphacholin C, niestrawność, zdrowa wątroba x 30 tabletek drażowanych



Cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Herbapol
Substancja czynna	Productum compositum
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Raphacholin C - 30 tabletek drażowanych

Opis produktu:

Raphacholin C to ziołowy lek w formie tabletek drażowanych wydawany bez przepisu lekarza, tradycyjnie stosowany w przypadku niestrawności, dyskomfortu trawiennego wynikającego z nieprawidłowej czynności wątroby

Skład:

1 tabletkę drażowaną zawiera: 150 mg wyciągu suchego z Raphanus sativus L., radix (korzeń rzodkwi czarnej) (DERnatywny 30-42:1) z węglem aktywnym (1:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 85 % V/V, 47 mg wyciągu gęstego z Cynarae scolymus L., herba (ziele karczocha) (DER 2-4:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 50 % V/V, 40 mg kwasu dehydrocholowego (Acidum dehydrocholicum), 15 mg olejku eterycznego z Mentha piperita L., aetheroleum (olejek eteryczny miętowy)

- **Substancje pomocnicze** - substancje pomocnicze) to: sacharoza, powidon, celuloza mikrokryształiczna, guma arabska, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, magnezu stearynian, substancja barwiąca Pigment Blend PB-277000 (tlenek żelaza czarny i dwutlenek tytanu)

Wskazania:

- niestrawność
- dolegliwości trawienne związane z dysfunkcją wątroby (wzdęcia, bóle brzucha, odbijanie, nudności, zaparcia)
- zaburzenia aktywności skurczowej pęcherzyka żółciowego

Działanie:

- żółciopędne
- żółciotwórcze

Dawkowanie:

lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

Dorośli:

- w niestrawności: jednorazowo 1-3 tabletki
- w innych dolegliwościach trawiennych: przeciętnie 1-2 tabletki 3 razy dziennie, 30 minut po posiłku
- w zaparciach: 2 tabletki rano i wieczorem 30 minut przed jedzeniem

Dzieci powyżej 10 lat:

- stosować jedynie po konsultacji z lekarzem 1 tabletkę 3 razy dziennie po posiłku
- lek należy przyjmować doustnie

W przypadku znacznego przedawkowania, które wielokrotnie przekracza zalecane dawki (spożycie kilkudziesięciu tabletek drażowanych za jednym razem) mogą sporadycznie wystąpić: wymioty, biegunka, dyselektrolicemia, zaczerwienienie twarzy, bóle głowy, zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca, skurcze mięśniowe, uczucie znużenia, osłabienie, nudności

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku Raphacholin C:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli występują ciężkie choroby wątroby, niedrożność dróg żółciowych i przewodu pokarmowego, ostre i przewlekłe stany zapalne żołądka i jelit

W przypadku kamicy żółciowej lek stosować po konsultacji z lekarzem

Działanie niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- sporadycznie mogą wystąpić luźne stolce, kolka żółciowa oraz reakcje alergiczne na składniki leku. W przypadku wystąpienia któregośkolwiek z wymienionych objawów należy przestać stosowania leku

- w przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce należy poinformować o nich lekarza

Ciąża i karmienie piersią:

- ze względu na brak badań odnośnie bezpieczeństwa leku u kobiet w ciąży, nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w tym okresie
- nie badano bezpieczeństwa leku u kobiet karmiących piersią. Niektóre składniki preparatu przenikają do mleka matki, dlatego nie zaleca się samodzielnego stosowania preparatu w okresie laktacji

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty

- dotychczas nie opisano istotnych interakcji z innymi lekami
- w dużych dawkach z lekami hipotensyjnymi i moczopędnymi potencjalnie może powodować hipokaliemię

Przechowywanie:

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C
- Nie zamrażać
- Chronić przed słońcem i innymi źródłami ciepła
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci

Podmiot odpowiedzialny:

Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol" S.A.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.