

## Starazolin, krople do oczu 0,5 mg/ml, 10 ml



Cena: 17,79 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Polfa Warszawa
Substancja czynna	Tetryzolinum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Starazolin, krople do oczu 0,5 mg/ ml - 2x5 ml

(Tetryzolini hydrochloridum)

### Opis produktu:

Lek Starazolin zawiera substancję czynną tetryzolinę, która jest aminą sympatykomimetyczną, pochodną imidazoliny. Po miejscowym zastosowaniu leku do oka, zwężeniu ulegają małe naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek.

### Skład:

Substancją czynną jest - tetryzolina.

Substancje pomocnicze - sodu chlorek, edetynian sodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, woda wysokooczyszczona.

1 ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodoru tetryzoliny.

### Wskazania:

W leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami drażniącymi, takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw.

## Działanie:

- Starazolin łagodzi objawy towarzyszące: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.
- Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dzieci powyżej 2 lat, młodzież i dorośli:** 1-2 krople, 2-3 razy na dobę.

- Lek do stosowania miejscowego, do worka spojówkowego.
- Kropli nie należy stosować długotrwale, szczególnie u dzieci.
- Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu zakraplacza ze skórą lub inną powierzchnią - krople są roztworem jałowym.
- Jeśli pacjent nosi soczewki, przed aplikacją należy je zdjąć i założyć ponownie po 15 minutach od zakropienia.

## Przeciwwskazania:

**Nie stosować:**

- w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - tetrazyliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- u osób ze stwierdzoną jaskrą, szczególnie z wąskim kątem przesączania lub w innych ciężkich schorzeniach oczu,
- u osób poniżej 2 lat,
- u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):**

- działania ogólnoustrojowe - bóle głowy, kołatanie serca, osłabienie, nadmierna potliwość, podwyższenie ciśnienia tętniczego, drżenia,
- reaktywne przekrwienie, pieczenie błon śluzowych, suchość błon śluzowych.

**Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):**

- nadmierne rogowacenie spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Starazolin może wchodzić w interakcję z:

- inhibitorami MAO, TLPD, rezepriną,
- insuliną, atropiną, środkami znieczulającymi.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku nasilenia się objawów stanu zapalnego należy skonsultować się z lekarzem.
- Leku nie zaleca się stosować w infekcjach, uszkodzeniu rogówki, w nasilonym bólu.
- W przypadku braku poprawy po 2-dniowym stosowaniu Starazolin, należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek stosować ostrożnie w przypadku stwierdzonych ciężkich chorób układu krążenia (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze), guza chromocłonowego nadnerczy, cukrzycy, nadczynności tarczycy.
- Lek stosować ostrożnie, jeśli pacjent przyjmuje inhibitory MAO lub inne leki, które mogą podnosić ciśnienie krwi.
- Lek zawiera chlorek benzalkoniowy, może on powodować podrażnienie oczu. Należy unikać kontaktu z soczewkami kontaktowymi. Zaleca się 15-minutowy odstęp czasu między aplikacją kropli i ponownym założeniem soczewek.
- Natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią: silny ból oka, ból głowy, zanik widzenia.
- Lek ten nie jest skuteczny w przypadku reakcji alergicznych typu późnego - zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.
- Po pierwszym otwarciu butelki, lek należy zużyć w ciągu 28 dni.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.

