

# Tadalafil Maxigra, 10 mg, dla mężczyzn, 2 tabletki



Cena: 34,99 PLN

## Opis słownikowy

Producent / Marka	Polpharma
Substancja czynna	Tadalafilum
Typ produktu	

## Opis produktu

## Produkt leczniczy bez recepty

## Tadalafil Maxigra 10 mg - 2 tabletki powlekane

### Opis produktu:

Lek Tadalafil Maxigra zawiera substancję czynną tadalafil, stosowany jest w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.

Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”. W celu bezpiecznego zastosowania leku proszę odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu.

### Skład:

Substancją czynną jest Tadalafilum.

Każda tabletki zawiera 10 mg tadalafilu (Tadalafilum).

**Substancje pomocnicze:** laktosa jednowodna, powidon K 30, poloksamer typ 188, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek żółty (E172), żelaza tlenek czerwony (E172)

## Wskazania:

- Leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn.
- Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna.
- Produkt Tadalafil Maxigra nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

## Działanie:

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zalecana dawka Tadalafil Maxigra to jedna tabletką 10 mg, przyjmowana przed planowaną aktywnością seksualną.**
- Lek należy zażyć przynajmniej 30 minut przed planowaną aktywnością seksualną.
- Lek może być skuteczny do 36 godzin po przyjęciu tabletki.
- Lek do stosowania doraźnego, w miarę potrzeby.
- **Nie stosować częściej niż 1 raz w tygodniu.**
- **Nie przyjmować więcej niż 1 tabletkę.**
- Ważna jest świadomość, że lek Tadalafil Maxigra nie działa przy braku stymulacji seksualnej.
- Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością wody.
- Tabletki można zażywać niezależnie od posiłków.
- Leku Tadalafil Maxigra nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń erekcji.

## Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

### Nie stosować leku jeśli:

- Jeśli pacjent przyjmuje leki zawierające azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek leki z tej grupy. Leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej (ból w klatce piersiowej). Wykazano, że lek Tadalafil Maxigra nasila działanie tych leków. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki lub inne środki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. „poppers”), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba serca lub pacjent przeżył zawał serca w ciągu ostatnich 90 dni.

- Jeśli pacjent przeżył udar w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
- Jeśli u pacjenta występuje niskie ciśnienie krwi lub niekontrolowane wysokie ciśnienie krwi.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętnicznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (NAION), określaną jako „porażenie oka”.
- Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat (np. Adempas). Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, powinien poinformować o tym lekarza.

Do grupy azotanów należą następujące leki:

- **nitrogliceryna (Glyceroli trinitras)** – np. Nitrocard, Nitromint, Sustonit, Nitroderm, Minitran,
- **monoazotan izosorbidu (Isosorbidi mononitras)** – np. Effox, Isosorbide mononitrate Vitabalans, Isosorbidi mononitras Accord, Mono Mack, Mononit, Monosan, Olicard retard,
- **diazotan izosorbidu (Isosorbidi dinitras)** – np. Sorbonit,
- **tetraazotan pentaerytrotolu (Pentaerythryli tetranitras)** – np. Galpent, Pentaerythritol compositum.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi jakiegokolwiek działanie niepożądane podane poniżej, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza:

- **reakcje alergiczne**, w tym wysypki (niezbyt często).
- **ból w klatce piersiowej** - nie wolno stosować azotanów, należy natychmiast zwrócić się po pomoc lekarską (niezbyt często).
- **priapizm** - przedłużona i być może bolesna erekcja po przyjęciu leku Tadalafil Maxigra (rzadko).
- Jeśli wystąpiła taka erekcja i trwa nieprzerwanie dłużej niż 4 godziny, to należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku niepodjęcia natychmiastowego leczenia może dojść do uszkodzenia tkanek i trwałej utraty potencji.
- **nagła utrata widzenia** (rzadko).

**Często (obserwowane u mniej niż 1 na 10 pacjentów):**

- ból głowy, ból pleców, ból mięśni, ból rąk i nóg, zaczerwienienie twarzy, przekrwienie błony śluzowej nosa i niestrawność.

**Niezbyt często (obserwowane u mniej niż 1 na 100 pacjentów):**

- zawroty głowy, ból brzucha, nudności, wymioty, zarzucanie treści żołądkowej do przełyku niewyraźne widzenie, ból oczu, trudności w oddychaniu, obecność krwi w moczu, przedłużony czas trwania wzdodu, uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, krwawienie z nosa, dzwonięcie w uszach, obrzęk rąk, stóp lub kostek i uczucie zmęczenia.

**Rzadko (obserwowane u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):**

- omdlenia, drgawki i przemijająca utrata pamięci, obrzęk powiek, zaczerwienienie oczu, nagłe pogorszenie lub utrata słuchu, pokrzywka (swędzące, czerwone uwypuklenia na powierzchni skóry), krwawienie z prącia, obecność krwi w nasieniu i zwiększona potliwość.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

**Tadalafil Maxigra może wchodzić w interakcje z:**

lekami z grupy azotanów, leami blokującymi receptory alfa-adrenolityczne, innymi lekami stosowanymi w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi, ketokonazolem w tabletkach, inhibitorami proteazy, fenobarbitalem, fenytoiną i karbamazepiną (leki przeciwdrgawkowe), ryfampicyną, erytromycyną, klarytromycyną (antybiotyki), itrakonazolem (stosowanym w leczeniu zakażeń grzybiczych), innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

**Leku nie należy stosować jednocześnie:**

- z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzrodu,
- z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem sydenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. tadalafil).

**Dzieci i młodzież:**

Leku nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

**Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:**

Lek nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

**Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

Lek Tadalafil Maxigra może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

## Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

## Podmiot odpowiedzialny:

Polpharma S.A. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański.

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.