

## Vratizolin 30mg/g, krem na opryszczkę, 3g



Cena: 36,99 PLN

### Opis słownikowy

Producent / Marka	Bausch Health
Substancja czynna	Denotivirum
Typ produktu	

### Opis produktu

## Lek bez recepty

### Vratizolin 30mg/g - 2 g

(Aciclovirum)

### Opis produktu:

Vratizolin to produkt leczniczy o działaniu przeciwwirusowym do stosowania w opryszczce ust i twarzy wywołanej wirusem Herpes simplex.

### Skład:

- Substancją czynną kremu jest denotywir (Denotivirum).

1 g kremu zawiera 30 mg denotywiru.

- Pozostałe składniki:** lkołol cetylowy, alkohol stearylowy, cetylu palmitynian 15, wazelina biała, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, sodu laurylosiarczan, woda oczyszczona

### Wskazania:

- Leczenie opryszczki warg i twarzy wywołanej przez wirusa opryszczki zwykłej (Herpes simplex).

## Działanie:

- Vratizolin wykazuje działanie przeciwwirusowe ze względu na zawarty w leku denotywir - substancję należącą do leków przeciwwirusowych. Denotywir skraca czas trwania choroby, zastosowanie leku Vratizolin w okresie tzw. prodromalnym może zapobiec rozwojowi choroby (nie jest to jednak działanie zapobiegawcze).

## Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- O ile lekarz nie zaleci inaczej, zmianę opryszczkową należy smarować kilka razy dziennie niewielką ilością leku.
- Lek do stosowania miejscowego na skórę.
- Przed zastosowaniem kremu należy umyć ręce w celu nieprzenoszenia infekcji na inne partie skóry.
- Stosowanie leku powinno rozpocząć się w momencie pojawienia się pierwszych symptomów jak pieczenie czy swędzenie.
- Leczenie trwa zwykle 5 dni.

## Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na denotywir, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten powoduje działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

### Częstość nieznaną:

- miejscowe reakcje jak podrażnienie skóry w miejscu aplikacji, kontaktowe zapalenie skóry,
- objawy nadwrażliwości.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą

- Lek Vratizolin przeznaczony jest do stosowania miejscowego na wargi i skórę twarzy. Lek nie powinien być używany na błony śluzowe, do oczu, w okolicach narządów płciowych.
- Osoby z leczoną opryszczką powinny zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa w trakcie leczenia - powinny unikać niepotrzebnego dotykania miejsca zmienionego chorobowo oraz powinny unikać dotykania rękami miejsca z opryszczką.
- W przypadku opryszczki o ciężkim przebiegu, należy skonsultować się z lekarzem.
- Jeśli leczenie przerwane jest zbyt szybko, objawy choroby mogą ulec pogorszeniu.
- Vratizolin zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować miejscowe reakcje skórne jak kontaktowe zapalenie skóry.

- Lek zawiera glikol propylenowy - może powodować podrażnienia skóry.
- Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan - mogą powodować reakcje alergiczne, także typu późnego.

### Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

### Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

- Nie należy stosować tego leku przeciwwirusowego na opryszczkę u dzieci w wieku poniżej 4 tygodni.

## Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować: np. innych lekach przeciwwirusowych na opryszczkę i półpasiec, o innych maściach na opryszczkę w nosie, wargową i intymną, również tych dostępnych bez recepty.

## Przechowywanie:

- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.

## Podmiot odpowiedzialny:

Bausch Health Ireland Limited, Dublin, Irlandia

## Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym