

Ziaja, Altaziaja, 1%, żel, lek, ściągający, przeciwobrzękowy, urazy, oparzenia, stłuczenia, 75 G



Cena: 6,60 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ziaja
Substancja czynna	Alumini acetotartras
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Altaziaja 10 mg/g, żel - 75 g

(Alumini acetotartras)

Opis produktu:

Altaziaja to produkt leczniczy o działaniu przeciwobrzękowym i ściągającym do stosowania w obrzękach (pourazowych, stawowych, po oparzeniach I stopnia) i stłuczeniach.

Skład:

Substancją czynną jest: glinu octanowinian (Alumini acetotartras).

Substancje pomocnicze: mentol, etylu parahydroksybenzoesan (E 214), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), etanol 96%, karbomer, trietanolamina, woda oczyszczona.

1 gram żelu zawiera 10 mg glinu octanowinianu.

Wskazania:

- Produkt leczniczy Altaziaja stosuje się w obrzękach i stłuczeniach wynikających z urazu, obrzękach stawowych i obrzękach towarzyszących oparzeniu I stopnia.

Działanie:

- **Altazija** wykazuje działanie przeciwobrzękowe i ściągające, łagodzi ból i chłodzi w miejscu aplikacji ze względu na zawartość mentolu.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek do stosowania zewnętrznego, miejscowego.

Dzieci od 3 roku życia i dorośli: 3-4 razy na dobę należy nanosić niewielką ilość żelu, najlepiej w postaci okładów.

Nie stosować w wieku poniżej 3 lat.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

Nie stosować leku **Altazija**:

- w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- na otwarte, rozległe rany,
- na zakażoną skórę,
- na zmienioną chorobowo skórę,
- u dzieci do lat 3.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną:

- miejscowe reakcje skórne,
- maceracja skóry,
- odczyny rumieniowe, grudkowe, ziarninowe (u osób nadwrażliwych),
- hiperaluminemia, hipofosfatemia (dotyczy pacjentów z ciężką niewydolnością nerek).

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

- Nie są znane interakcje leku **Altazija** z innymi lekami.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Podczas stosowania leku **Altazija** należy unikać kontaktu z oczami i błonami śluzowymi.
- Lek zawiera E 214 - parahydroksybenzoesan etylu - reakcja alergiczna, także typu późnego.
- Nie stosować w wieku poniżej 3 lat.

Ciąża, karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

- Brak danych dotyczących stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

- Nie stosować w wieku poniżej 3 lat.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Podmiot odpowiedzialny:

Ziaja, Jesienna 9, Gdańsk

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Staramy się, aby zdjęcie i opis oferowanych produktów były aktualne, w pełni prawidłowe oraz kompletne. Jeśli widzisz błąd, poinformuj nas o tym.