

Alantan Plus krem, skóra podrażniona, sucha, odparzenia, rogowacenie skóry, 100 g



Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Unia
Substancja czynna	Allantoinum, Acidum panthotenicum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Alantan plus krem (20 mg/g + 50 mg/g), 100g

(Allantoinum + Dexpanthenolum)

Altantan plus krem to produkt leczniczy na różnego rodzaju ran, oparzeń, pielęgnacja sutków podczas karmienia piersią, zapobieganie odparzeniom u niemowląt, pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej, nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp, wspomagająco w leczeniu atopowego zapalenia skóry, wyprysku alergicznego, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Skład:

1g kremu zawiera: **substancje czynne:** 20mg allantoiny oraz 50mg deksopantenolu (50% roztwór pantenolu w glikolu propylenowym).

Substancje pomocnicze:

Lanoline, parafinę ciekłą, alkohol cetostearylowy, etylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, wodę oczyszczoną, polawax NF.

Wskazania:

Krem Alantan plus stosuje się w przypadku:

- Pielęgnacja skóry podrażnionej i wysuszonej.

- Leczenie różnego rodzaju ran, jak: otarcia, niewielkie skaleczenia i pęknięcia skóry.
- Leczenie oparzeń słonecznych oraz po radioterapii i fototerapii.
- Zapobieganie odparzeniom u niemowląt.
- Nadmierne rogowacenie skóry dłoni i stóp.
- Wspomagająco w atopowym zapaleniu skóry, wyprysku alergicznym, zapaleniu błony śluzowej nosa i owrzodzeniach podudzi.

Działanie:

- **Alantoina** - działa złuszcząco oraz osłaniająco na skórę, poprawia jej nawilżenie oraz wspomaga leczenie ran przez pobudzanie wzrostu nowej tkanki.
- **Alantoina** - stosowana regularnie w nadmiernym rogowaceniu skóry, może zapobiec nadmiernemu odkładaniu się keratyny (rodzaj białka).
- **Deksopantenol** - głęboko wnika w skórę, gdzie przekształca się w kwas pantotenowy.
- **Deksopantenol** - ma zdolność wiązania wody, dzięki czemu zwiększa elastyczność skóry.

Dawkowanie:

- Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skórę. Miejsca chorobowo zmienione należy smarować zwykle raz lub kilka razy na dobę.

Przeciwwskazania:

Nie stosować produktu leczniczego:

- w nadwrażliwości na alantoinę, deksopantenol lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- do oczu,
- na zmiany skórne w okresie ostrego stanu zapalnego z obecnością zmian sączących.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Podmiot odpowiedzialny:

Zakłady Farmaceutyczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, ul. Chłodna 56/60, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent: Zakłady Farmaceutyczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy
Adres: ul. Chłodna 56/60, 00-872 Warszawa
E-mail: unia@uniapharm.pl