

DIH 500mg, 60 tabletek powlekanych



Cena: 33,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Hasco-Lek
Substancja czynna	Diosminum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

DIH 500 mg, 60 tabletek powlekanych

(Diosminum)

DIH 500 mg to lek w postaci tabletek powlekanych. Substancją czynną leku jest diosmina, która jest związkiem należącym do tzw. bioflawonoidów. Lek działa poprzez zwiększenie napięcia w naczyniach żylnych oraz działa na nie ochronnie.

Skład:

- **Substancja czynna:** diosmina
- **Substancje pomocnicze:** celuloza mikrokryształiczna, powidon, karboksymetyloskrobia sodowa, magnezu stearynian, otoczka Opadry II 85F24220 Pink [poliwinylowy alkohol, tytanu dwutlenek (E 171), Makro.

1 tabletkę zawiera 500 mg zmikronizowanej diosminy.

Wskazania:

DIH 500mg jest stosowany u pacjentów w przypadku objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

- bóle i nocne kurcze nóg,
- uczucie ciężkości nóg,

- żylaki kończyn dolnych,
- poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajęczki naczyniowe,
- obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg),
- w objawowym leczeniu żylaków odbytu (hemoroidów).

Działanie:

- zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia; zwiększa drenaż limfatyczny,
- wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu,
- zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zazwyczaj stosowana dawka to dwie tabletki na dobę podczas posiłku**, tj. po 1 tabletkę rano i wieczorem (co odpowiada podaniu dawki dobowej 1000 mg diosminy, w dwóch dawkach podzielonych po 500 mg).
- **Jedynie w przypadkach zaostrzenia dolegliwości spowodowanych żylakami odbytu zaleca się podawanie większych dawek do 6 tabletek na dobę**, tj. 2 razy na dobę po 3 tabletki przez 4 dni, a przez kolejne 3 dni zmniejszenie dawki: 4 tabletki na dobę, tj. 2 razy na dobę po 2 tabletki.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na diosminę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):

- niestrawność,
- nudności,
- wymioty,
- zawroty głowy,
- ból głowy,
- złe samopoczucie,
- wysypka, świąd, pokrzywka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Stosowanie leku w przypadku zaostrzenia stanu żyłaków odbytu powinno być krótkotrwałe i jest to leczenie objawowe. Stosowanie tego leku nie wyklucza konieczności stosowania innych leków doodbytniczych.
- W przypadku zaburzonego krążenia żylnego w nogach należy wziąć pod uwagę zmianę trybu życia: unikanie ekspozycji słonecznej i przebywania w pozycji stojącej dłuższy czas, kontrolę wagi, noszenie specjalnych pończoch.
- W przypadku pogorszenia się objawów zaburzonego przepływu żylnego - stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenia skóry - należy skonsultować się z lekarzem.
- Lek jest nieskuteczny w przypadku obrzęków spowodowanych chorobami serca, nerek lub wątroby.

Stosowanie innych leków:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach nawet tych, które wydawane są bez recepty.

- Diosmina może zwiększać stężenie we krwi i obniżać wydalanie metronidazolu (lek o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwpierwotniakowym) i diklofenaku (lek przeciwbólowy i przeciwzapalny).

Ciąża i karmienie piersią:

- W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko
- Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze do 25°C

Podmiot odpowiedzialny:

HASCO-LEK, Żmigrodzka 242e, Wrocław.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.