

Flos, Kora kruszyny (Frangulae cortex), zioła do zaparzania, 50g



Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Flos
Substancja czynna	Rhamnus frangula
Typ produktu	Lek ziołowy

Opis produktu

Lek bez recepty

Flos, Kora kruszyny (Frangulae cortex), zioła do zaparzania, 50g

Skład:

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Skład leku w przeliczeniu na 100 g:

Kora kruszyny (Frangulae cortex) 100g. Dawka jednorazowa 04 g kory kruszyny (1 ml według załączonej miarki dozującej) zawiera 28 mg – 30 mg glukofrangulin w przeliczeniu na glukofrangulinę A.

Wskazania do stosowania:

- W zaparciach jako środek przeczyszczający.

Droga podania i sposób stosowania:

Podanie doustne w postaci odwaru:

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:

Dołączony do opakowania kieliszek napełnić produktem do kreski z oznaczeniem 1 ml (0,4g produktu) a następnie odmierzoną ilość kory kruszyny zalać 1 filiżanką gorącej wody, zagotować i utrzymywać we wrzeniu przez okres 15 min., odstawić na 10 min., przecedzić i ostudzić. Świeży i ciepły odwar pić raz dziennie przed snem. Nie zaleca się stosowania częściej niż 2-3 razy w tygodniu i przez okres dłuższy niż 1-2 tygodnie. W przypadku wątpliwości należy poradzić się lekarza. Nie należy przyjmować większej dawki niż szklanka odwaru przygotowana z 0,4 g kory kruszyny (1 ml według załączonej miarki). U niektórych pacjentów korzystne może być zastosowanie niższej dawki, np. pół szklanki odwaru. Zaleca się stosowanie jak najniższej dawki, która u pacjenta powoduje uzyskanie efektu miękkiego stolca.

Przeciwwskazania:

- Uczulenie na korę kruszyny, niedrożność, zwężenie lub atonia jelit, ostre choroby zapalne jelit np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zapalenie wyrostka robaczkowego, bóle brzucha o nieznannej etiologii, stany odwodnienia z utratą elektrolitów, dzieci poniżej 12 lat, ciąża.

Przedawkowanie:

- Silny ból brzucha, biegunka, która prowadzi do utraty elektrolitów, szczególnie potasu.
- W przypadku przedawkowania leku należy skontaktować się z lekarzem.

Interakcje:

- Przy stosowaniu przewlekłym lub nadużywaniu niedobór potasu może spowodować wzmożenie działania glikozydów nasercowych oraz wpływać na działanie środków przeciwaritmicznych.
- Straty potasu mogą zwiększyć się przy jednoczesnym stosowaniu tiazydowych środków moczopędnych, adrenokortykosteroidów i korzenia lukrecji.

Działanie niepożądane:

- Podczas stosowania może wystąpić reakcja nadwrażliwości na korę kruszyny. Ponadto obserwowano bóle skurczowe w obrębie jamy brzusznej oraz biegunkę, szczególnie u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Wystąpienie takich objawów świadczy o zastosowaniu zbyt wysokiej dawki. Przy stosowaniu przewlekłym lub nadużywaniu mogą wystąpić zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, szczególnie utrata potasu, które powodują zaburzenia czynności serca i osłabienie mięśni zwłaszcza przy jednoczesnym przyjmowaniu glikozydów sercowych, środków moczopędnych i steroidów kory nadnerczy. Ponadto przy przewlekłym stosowaniu może wystąpić białkomocz, krwimocz oraz odkładanie barwnika w błonie śluzowej jelita grubego (pseudomelanosis coli), które najczęściej zanika po odstawieniu leku. Podczas stosowania kory kruszyny może wystąpić zmiana koloru moczu, co nie ma znaczenia klinicznego. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o nich lekarza.

Środki ostrożności związane ze stosowaniem:

- Kora kruszyny nie może być stosowana bez porady lekarza przez dłuższy czas (dłużej niż 1 – 2 tygodnie).
- Stosowanie leku przez dłuższy okres czasu (dłużej niż 1 – 2 tygodnie) może prowadzić do przyzwyczajenia, konieczności

zwiększenia dawki, atonii jelit i nasilenia zaparć.

- Korę kruszyny powinno się stosować dopiero, gdy zmiana pożywienia lub preparaty ze środkami pęczniejącymi nie dają efektu terapeutycznego.

Nie stosować kory kruszyny w przypadku wystąpienia takich objawów jak:

- silne bóle brzucha, wymioty i wzdęcia, ponieważ mogą one świadczyć o niedrożności jelit.

Ciąża i laktacja:

- Nie stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu:

- Brak danych.

Przechowywanie:

- Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
- Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: IL-3121/LN

Masa netto: 50 g

Podmiot odpowiedzialny:

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS, Elżbieta i Jan Głąb spółka jawna, 98-345 Mokrsko 118.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.