

Magne B6 Forte, magnez, 180 tabletek



Cena: 83,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Opella healthcare
Substancja czynna	Magnesium, Pyridoxinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Magne B6 Forte, 100 mg + 10 mg - 180 tabletek powlekanych

(Magnesii citras + Pyridoxini hydrochloridum)

Magne B6 Forte to produkt leczniczy w postaci tabletek powlekanych, który uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 roku życia i osób dorosłych. Zawiera dobrze przyswajalną sól magnezu - **cytrynian**.

Skład:

Substancjami czynnymi leku są:

- jony magnezu (w postaci magnezu cytrynianu) - 100 mg
- pirydoksyny chlorowodorek (witamina B6) - 10 mg

Substancje pomocnicze to - laktoza bezwodna, makrogol 6000, magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk.

Wskazania:

Produkt jest wskazany do stosowania w niedoborach magnezu.

Występowanie poniżej wymienionych objawów może wskazywać na niedobór magnezu:

- nerwowość, drażliwość, wahania nastroju, łagodny lęk, niepokój, przejściowe uczucie zmęczenia, ospałość, zaburzenia snu w niewielkim nasileniu;
- objawy lęku, takie jak kurcze przewodu pokarmowego lub kołatanie serca (bez zaburzeń serca);
- kurcze mięśni, mrowienie, drganie powiek.

Uzupełnienie magnezu może złagodzić powyższe objawy

Działanie:

Magne B6 Forte zawiera jony magnezowe oraz chlorowodorek pirydoksyny (witaminę B6). Lek uzupełnia niedobory magnezu i (lub) witaminy B6 w organizmie.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli** - od 3 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych podczas posiłku.
- **Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku 6 lat lub starszych (o masie ciała około 20 kg)** - od 10 do 30 mg/kg mc. na dobę tzn. od 2 do 4 tabletek na dobę, w 2 lub 3 dawkach podzielonych, podczas posiłków.

Tabletki należy połykać, popijając dużą ilością wody.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Nie należy stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek i stosujących lewodopę.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznaną (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nadwrażliwość,
- biegunka, ból brzucha,
- reakcje skórne, w tym pokrzywka, świąd, wyprysk, rumień.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- **Lewodopa** - Produkt leczniczy Magne B6 Forte jest przeciwwskazany u pacjentów otrzymujących lewodopę w monoterapii (tj. bez inhibitorów obwodowej dopa-dekarboksylazy), ponieważ pirydoksyna zmniejsza lub hamuje aktywność lewodopy.

- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania **solii wapnia i fosforanów**, ponieważ składniki te hamują jelitowe wchłanianie magnezu.
- Podanie produktu leczniczego Magne B6 Forte należy odłożyć na co najmniej 3 godziny **po zastosowaniu doustnych tetracyklin**.
- **Chinolony** - należy podawać co najmniej dwie godziny przed lub sześć godzin po zastosowaniu produktów na bazie magnezu, aby uniknąć zakłócenia ich wchłaniania.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Należy zachować szczególną **ostrożność u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek** ze względu na ryzyko wystąpienia wysokiego stężenia magnezu we krwi.
- Na skutek przyjmowania wysokich dawek pirydoksyny przez długi czas **może wystąpić czuciowa neuropatia aksonalna** (uczucie mrowienia).
- Lek zawiera **laktozę**.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek wskazany dla dzieci od 6 roku życia i masy ciała około 20 kg.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

- Lek należy przyjmować podczas posiłków, popijając wodą.

Płodność:

- Badania nad witaminą B6 wykazują wpływ na płodność mężczyzn. Jednakże taki efekt obserwuje się tylko przy bardzo wysokich dawkach. Bezpieczeństwo Magne B6 Forte jest bardzo wysokie ze względu na niską zawartość witaminy B6.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Lek Magne B6 Forte nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, Warszawa.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.