

Protrivagin, 100 000 000 CFU, 6 kapsułek dopochwowych, twardych



Cena: 35,99 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Verco
Substancja czynna	Lactobacillus plantarum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek bez recepty

Protrivagin, 100 000 000 CFU, 6 kapsułek dopochwowych, twardych

(Lactobacillus plantarum P 17630)

Lek Protrivagin jest lekiem stosowanym dopochwowo. Szczep bakteryjny Lactobacillus plantarum zawarty w leku Protrivagin wchodzi w skład naturalnej flory mikrobiologicznej pochwy.

Skład:

- **Substancja czynna:** Lactobacillus plantarum P 17630 nie mniej niż 108 CFU
- **Substancje pomocnicze:** skrobia kukurydziana, mannitol, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna uwodniona, Otoczka kapsułki: żelatyna tytanu dwutlenek (E 171).

Wskazania:

Lek Protrivagin jest wskazany do stosowania u dorosłych kobiet w celu:

- normalizacji zaburzonej mikrobioty pochwy po antybiotykoterapii waginozy bakteryjnej,
- utrzymania prawidłowej mikrobioty pochwy w przypadku jej nawracających zakażeń.

Dawkowanie i sposób podawania:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorosłe kobiety:

- **Po antybiotykoterapii waginozy bakteryjnej:** należy wprowadzać 1 kapsułkę głęboko do pochwy na noc przed snem przez 6 dni.
- **W celu utrzymania prawidłowej mikroflory pochwy w przypadku jej nawracających zakażeń:** należy wprowadzać 1 kapsułkę dopochwową na dobę, głęboko do pochwy na noc przed snem przez 6 kolejnych dni. W razie potrzeby cykl można powtarzać raz w miesiącu przez kolejne 2 miesiące.

Kobiety miesiączkujące powinny rozpocząć kurację bezpośrednio po miesiączce.

Sposób podawania:

Kapsułkę wprowadzić głęboko do pochwy, w pozycji leżącej na plecach, wieczorem przed snem.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje ze strony sromu i pochwy, takie jak pieczenie, swędzenie, podrażnienie i dyskomfort. W takim przypadku nie należy kontynuować stosowania tego produktu leczniczego. Mogą również wystąpić niewielkie upławy.

Często (występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentek):

- Uczucie pieczenia sromu i pochwy

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- Upławy
- Podrażnienie pochwy
- Ból pochwy
- Utrata krwi poprzez pochwę
- Dyskomfort w obrębie sromu i pochwy
- Świąd sromu i pochwy
- Reakcje alergiczne
- Świąd
- Wysypka
- Nudności
- Ból brzucha

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

- Nie należy stosować produktu leczniczego Protrivagin razem z prezerwatywami lub innymi miejscowymi metodami antykoncepcji (np. diafragmą), ponieważ nie można wykluczyć osłabienia działania tych środków.
- W trakcie leczenia nie należy wykonywać irygacji pochwy z użyciem preparatów antyseptycznych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Produkt leczniczy Protrivagin nie zastępuje antybiotykoterapii ani chemioterapii, ale stanowi ich użyteczne uzupełnienie, przywracając, zwłaszcza pod koniec swoistego leczenia przeciwbakteryjnego, fizjologiczne warunki panujące w środowisku pochwy.

Dzieci i młodzież:

- Nie należy stosować produktu leczniczego Protrivagin u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację:

- Nie przewiduje się, aby produkt leczniczy wywierał wpływ na ciążę lub na noworodka/niemowlę karmione piersią, ponieważ ekspozycja ogólnoustrojowa na *Lactobacillus plantarum* P 17630 jest znikoma.
- Produkt leczniczy Protrivagin może być stosowany przez kobiety w ciąży i w okresie karmienia piersią.
- Nie stwierdzono, aby produkt leczniczy wywierał wpływ na płodność.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Produkt leczniczy Protrivagin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

Verco S.A., Skwer kard. S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U, 01-015 Warszawa.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent: Verco S.A.

Adres: Skwer Kard S. Wyszyńskiego 5, lok. 6U 01-015 Warszawa

E-mail: biuro@verco.com.pl