

Slow-Mag, 64 mg Mg²⁺, 60 tabletek dojelitowych

Cena: 15,19 PLN



Opis słownikowy

Producent / Marka	Ethifarm
Substancja czynna	Magnezii chloridum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Slow-Mag, 60 tabletek

(Magnezii chloridum hexahydricum)

Slow-Mag to produkt leczniczy dostarczający magnez w tabletkach dojelitowych, które pozwalają uniknąć dolegliwości żołądkowych osobom z chorobą wrzodową żołądka (lek rozpuszcza się dopiero w jelicie).

Skład:

- **Substancją czynną jest** - magnezu chlorek sześciowodny
- **substancje pomocnicze** - wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian.
- **Skład otoczki:** Eudragit L100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutyłu sebacynian, talk.

1 tabletkę zawiera 64 mg jonów magnezu.

Wskazania:

- **w celu uzupełnienia niedoborów magnezu, magnezu, którym towarzyszą:** bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany zmęczenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.

- w przypadku zwiększonej utraty magnezu, np. w czasie przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków).

Działanie:

- **Slow-Mag** uzupełnia niedobory magnezu w organizmie.
- Magnez to jeden z podstawowych minerałów w organizmie człowieka. Jego kationy występują w około trzystu reakcjach metabolicznych w organizmie, m. in. jest konieczny do prawidłowego działania enzymów, które uczestniczą w metabolizmie lipidów.
- Magnez wpływa na stan pobudliwości nerwowo-mięśniowej oraz odgrywa istotną rolę w procesie skurczu mięśnia sercowego.
- Slow-Mag wspomaga wbudowywanie wapnia do kośćca.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Zapobiegawczo** - 2 tabletki na dobę (1 tabletko rano i 1 tabletko wieczorem).
- **Przy stwierdzonym niedoborze magnezu:**

Dorośli: przez pierwsze 3 tygodnie 6 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 4 tabletki wieczorem), następnie 3 tabletki wieczorem.

Dzieci powyżej 6 lat: według zaleceń lekarza.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

Nie stosować Slow-Mag:

- jeśli pacjent ma uczulenie na chlorek magnezu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeśli występuje podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia),
- jeśli występuje znaczne niedociśnienie tętnicze lub zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego,
- jeśli pacjent ma ciężką niewydolność nerek lub miastenię (miastenia gravis).

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

- Możliwe jest wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, między innymi działania przeczyszczającego.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Slow-Mag może wchodzić w interakcje z:

- wapniem,
- tetracyklinami, fluorochinolonami, preparatami żelaza, związkami fluoru i doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnych warfaryny.
- lekami moczopędnymi, antybiotykami aminoglikozydowe, cysplatyną, mitramycyną, amfoterycyną B i mineralokortykosteroidami,
- amiodaronem,
- dihydralazyną.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Związki magnezu działają przeczyszczająco, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania leku. Przewlekła biegunka wywołana długotrwałym stosowaniem leków zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej (utrata wody i składników mineralnych).
- Podawanie leku pacjentom z niewydolnością nerek może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie i zatrucia magnezem.
- Stosowanie **Slow-Mag** z innymi produktami zawierającymi magnez może prowadzić do nadmiaru magnezu w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią:

- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- W zalecanych dawkach lek może być stosowany w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią jedynie na zlecenie lekarza.
- Nadmiar magnezu u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie gospodarki wapnia u płodu i noworodka.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:

Wchłanianie magnezu z tabletek dojelitowych ograniczają:

- kwasy organiczne,
- fityna,
- kwas szczawiowy,
- kwas galusowy (tanina),
- kwasy tłuszczowe,
- fosforany.

Lek należy przyjmować podczas posiłków lub bezpośrednio po posiłkach, popijając wodą.

Przechowywanie:

- lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
- przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła
- przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca
- leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko

Podmiot odpowiedzialny:

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Hiacyntowa 39, 60-175 Poznań.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.