

Slow-Mag B6, 64 mg + 5 mg, 50 tabletek dojelitowych



Cena: 15,19 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Ethifarm
Substancja czynna	Magnesii chloridum, Pyridoxinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Slow-Mag B6, 50 tabletek powlekanych dojelitowych

(Magnesii chloridum hexahydricum + Pyridoxini hydrochloridum)

Lek Slow-Mag B6 w formie tabletek dojelitowych zawiera magnez w postaci sześciowodnego chlorku magnezu oraz witaminę B6 w postaci chlorowodorku pirydoksyny. Lek stosuje się w niedoborach magnezu i witaminy B6.

Skład:

- **Substancją czynną leku jest** - magnez (w postaci soli) (Magnesii chloridum hexahydricum) i pirydoksyna (Pyridoxini hydrochloridum).
- **Substancje pomocnicze** - wapnia węglan strącony, powidon, talk, magnezu stearynian.
- Skład otoczki: Eudragit L 100-55 (kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu etylu 1:1), dibutyłu sebacynian, talk.

1 tabletkę zawiera:

- 64 mg - jonów magnezu (w postaci magnezu chlorku sześciowodnego)

- 5 mg - **witaminy B6** (chlorowodorek pirydoksyny).

Wskazania:

- Niedobory magnezu i witaminy B6.
- **Niedoborom magnezu mogą towarzyszyć:** bóle mięśniowe, tiki, drżenia mięśni, bóle głowy, stany znużenia, wzmożona drażliwość, zmniejszona odporność na stres, zaburzenia snu, zaburzenia stężenia lipidów w surowicy krwi, zaburzenia rytmu serca, przyspieszone zmiany miażdżycowe naczyń, nadciśnienie tętnicze, przyspieszona osteoporoza.
- Do zwiększonej utraty magnezu dochodzi także w trakcie przyjmowania leków moczopędnych.

Działanie:

- Magnez jest podstawowym regulatorem cyklu komórkowego.
- Jest aktywatorem wielu enzymów.
- Odgrywa ważną rolę w procesie skurczu mięśni.
- Wpływa korzystnie na proces krzepnięcia krwi.
- Stymuluje mechanizmy obronne organizmu, wywiera działanie uspokajające.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- **Dorośli**

W profilaktyce - 1 tabletko rano i 1 tabletko wieczorem.

W niedoborze magnezu i witaminy B6 - 5 tabletek na dobę (2 tabletki rano i 3 tabletki wieczorem) przez 3 tygodnie, następnie 3 tabletki wieczorem.

- **Dzieci powyżej 12 lat** - w terapii krótkotrwałej, maksymalnie do 3 tabletek na dobę w dawkach podzielonych.

Tabletki należy połykać w całości, bez rozgryzania ani dzielenia.

Po każdorazowym pobraniu leku pojemnik należy natychmiast szczelnie zamknąć.

Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu leczniczego.

- Podwyższone stężenie magnezu w surowicy krwi (hipermagnezemia)
- Znaczne niedociśnienie tętnicze
- Zaburzenia przewodnictwa mięśnia sercowego

- Niewydolność nerek
- Myasthenia gravis
- Nie stosować równocześnie z lewodopą.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana:

- zaburzenia żołądkowo-jelitowe m.in. działanie przeczyszczające.

Interakcje:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Slow-Mag B6 może wchodzić w interakcje z:

- fosforanami, kwasami organicznymi, kwasem szczawiowym (ograniczają wchłanianie magnezu),
- dużymi dawkami wapnia (spadek wchłaniania magnezu),
- tetracyklinami, fluorochinolonami, żelazem, związkami fluoru, doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (pochodne warfaryny),
- lekami moczopędnymi, antybiotykami aminoglikozydowymi, mineralokortykosteroidami,
- amiodaronem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Związki magnezu działają przeczyszczająco.
- Przewlekła biegunka związana z długotrwałym stosowaniem produktów leczniczych zawierających magnez może prowadzić do zaburzeń równowagi elektrolitowej.
- Podawanie produktu leczniczego pacjentom z niewydolnością nerek może spowodować hipermagnezemię i zatrucie magnezem.
- Stosowanie z innymi produktami zawierającymi magnez oraz witaminę B6 może prowadzić do nadmiaru magnezu i witaminy B6 w organizmie.

Ciąża i karmienie piersią:

- W zalecanych dawkach produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży i laktacji jedynie na zlecenie lekarza.
- Hipermagnezemia u ciężarnych kobiet może wpływać na zaburzenie homeostazy wapnia u płodu i noworodka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

- Produkt leczniczy w zalecanych dawkach nie wywiera negatywnego wpływu na sprawność fizyczną oraz psychiczną i nie jest przeciwwskazany w czasie wykonywania pracy zawodowej (w tym obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu) oraz podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży:

- Lek przeznaczony dla dzieci od 12 roku życia.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie przechowywać w lodówce. Nie zamrażać.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Podmiot odpowiedzialny:

ETHIFARM Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Hiacyntowa 39, 60-175 Poznań.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.