

# Tantum Verde, na ból gardła smak cytrynowy, 30 pastylek do ssania



Cena: 31,99 PLN

## Opis słownikowy

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Producent / Marka | Angelini Pharma |
| Substancja czynna | Benzydaminum    |
| Typ produktu      |                 |

## Opis produktu

## Lek bez recepty

### Tantum Verde, smak cytrynowy, 3 mg, 30 pastylek twardych

(Benzydaminii hydrochloridum)

## Skład:

Substancją czynną leku jest benzydaminii chlorowodorek.

Jedna pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminii chlorowodoru (Benzydaminii hydrochloridum), co odpowiada 2,68 mg benzydaminii

Pozostałe składniki to: izomalt (E 593), kwas cytrynowy jednowodny, kompozycja smakowozapachowa cytrynowa PHL-008469 zawiera m.in.: butylohydroksyanizol (E 320), alkohol benzyłowy (E 1519), cytral, cytronellol, d-limonen, geraniol, linalol kompozycja smakowo - zapachowa miętowa PHL-008468 (zawiera m.in.: alkohol benzyłowy (E 1519), cytronellol, d-limonen, eugenol, geraniol, linalol], aspartam (E 951), żółcień chinolinowa (E 104), indygotyna (E 132).

## Wskazania:

- Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy jest wskazany u osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat w leczeniu dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

## Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Produkt leczniczy zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią. Jest przeciwwskazany u pacjentów z fenyloketonurią.

## Działanie:

- W badaniach klinicznych potwierdzono skuteczność benzydaminu w usuwaniu dolegliwości związanych z zapalnymi schorzeniami jamy ustnej i gardła.
- Ponadto zaznaczone jest działanie miejscowo znieczulające benzydaminu.
- Te wszystkie właściwości są uzupełnione przez działanie antyseptyczne.
- Produkt leczniczy Tantum Verde smak cytrynowy jest na ogół dobrze tolerowany i wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne.

## Dawkowanie i sposób podawania:

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:** jedna pastylka 3 razy na dobę.

- Nie stosować dawki większej niż zalecana. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni.

### Dzieci i młodzież

**Dzieci w wieku od 6 do 11 lat:**

- Produkt leczniczy powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.

**Dzieci w wieku poniżej 6 lat:**

- Ze względu na postać farmaceutyczną, produktu leczniczego Tantum Verde smak cytrynowy nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### Sposób podawania:

- Podanie na błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
- Pastylkę należy ssać powoli. Nie połykać. Nie żuć.

## Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

**Wady wrodzone, choroby rodzinne i genetyczne:**

- Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) - Przedwczesne zamknięcie przewodu tętniczego u płodu

#### Zaburzenia żołądka i jelit:

- Rzadko (?1/10 000 do