

Tersilat krem, 10 mg/g, lek przeciwgrzybiczy, 30 g



Cena: 9,80 PLN

Opis słownikowy

Producent / Marka	Sun-Farm
Substancja czynna	Terbinafinum
Typ produktu	

Opis produktu

Lek wydawany bez recepty

Tersilat 10mg/g krem przeciwgrzybiczy, 30 g

(Terbinafini Hydrochloridum)

Tersilat to lek w postaci kremu do stosowania miejscowo na skórę. Zawiera 10 mg/g substancji czynnej - terbinafiny chlorowodorku. Tersilat jest stosowany zewnętrznie w celu leczenia grzybiczych lub drożdżakowych zakażeń skóry, m.in. grzybicy stóp. Terbinafina zawarta w leku działa grzybobójczo (powoduje śmierć komórek grzybów) na dermatofity i pleśnie. Na drożdżaki działa grzybobójczo lub grzybostatycznie (hamuje wzrost grzybów), w zależności od gatunku.

Wskazania:

Do stosowania zewnętrznie w celu leczenia grzybiczych lub drożdżakowatych zakażeń skóry takich jak grzybica stóp.

Skład:

1 g kremu zawiera:

- **substancję czynną:** 10 mg terbinafiny chlorowodorku,
- **substancje pomocnicze:** woda oczyszczona, alkohol cetostearylowy, izopropylu mirystynian, cetylu palmitynian, sorbitanu stearynian, alkohol benzylowy, polisorbat 60, sodu wodorotlenek.

Działanie:

- Przeciwgrzybicze.

Dawkowanie:

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek przeznaczony do stosowania miejscowo na skórę.
- Aplikuj oczyszczoną i osuszoną skórę.
- Nanieś cienką warstwę kremu na zakażone miejsca na skórze i nieco wokół nich. Rozetrzyj delikatnie krem.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

- **grzybica stóp:** raz na dobę przez tydzień,
- **grzybica wywołana przez dermatofity (grzybica fałdów skórnych, grzybica skóry gładkiej):** raz na dobę przez tydzień,
- **grzybicze zakażenia skóry (kandydoza skóra):** raz na dobę przez 1-2 tygodnie,
- **łupież pstry:** jeden do dwóch razy na dobę przez 2 tygodnie.

Przeciwwskazania:

- Nie stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat.
- W okresie ciąży lek można stosować wyłącznie na zalecenie lekarza.
- Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób):

- łuszczenie skóry, swędzenie.

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 osób):

- zmiany skórne, strupy, zaburzenia skóry, zaburzenia pigmentacji, zaczerwienienie (rumień), uczucie pieczenia skóry, ból, ból w miejscu stosowania, podrażnienie w miejscu stosowania.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 osób):

- suchość skóry, kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk, zaostrzenie zakażenia grzybiczego.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

- nadwrażliwość, wysypka.

Należy zaprzestać stosowania kremu oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z następujących objawów reakcji alergicznej:

- uporczywy świąd występujący z czerwoną wysypką lub guzkami, pokrzywka lub pęcherzyki,
- trudności w oddychaniu lub opuchnięcie ust, twarzy, warg, języka lub gardła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Tersilat krem 10 mg/g to lek przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Może powodować podrażnienie oczu, dlatego należy unikać kontaktu leku z oczami. Jeśli lek przypadkowo dostanie się do oczu, należy przemyć je bieżącą wodą.
- Lek Tersilat zawiera alkohol cetostearylowy, który może powodować miejscowe reakcje skórne (na przykład kontaktowe zapalenie skóry).
- Lek Tersilat zawiera alkohol benzylowy (15 mg alkoholu benzylowego w 1 g kremu), który może powodować łagodne miejscowe podrażnienie.

Przechowywanie:

- Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł światła.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu kremu wynosi 6 miesięcy.

Podmiot odpowiedzialny:

SUN-FARM Sp. z o.o., ul. Dolna 21, 05-092 Łomianki.

Dodatkowe informacje:

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.